

Sağlık, Eğitim, Araştırma
Merkezi

FİYATI: 15 TL

Anadolu Böbrek Vakfı Yayın Organı

Renaliz

64

ISSN 1305 - 8011

Yıl 19, Sayı: 64, 1 Mayıs 2018 – 1 Eylül 2018

Yaşamın güzel, yaşatabilmenin ise ondan daha güzel bir duygu olduğuna inanıyoruz.



20-22 Nisan 2018 tarihleri arasında Mostar Venue Hotel “Mepas” Bosna-Hersek’te gerçekleştirilen 4. Akdeniz Ülkeleri Böbrek Hastalıkları Derneği Kongresi’nin ardından 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi de, 9-13 Mayıs 2018, K.K.T.C, Bafra, Limak Antares Otel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.



55. ERA-EDTA Kongresi 24-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Bella Center’da düzenlenmiştir.

55. ERA-EDTA Kongresi yoğun ilgi görmüş olup göz ve çok yararlı bilgilerle dolu bir kongre idi.

ERA-EDTA Kongre gazeteleri üç gün boyunca yayınlanmış, kongre geniş bir katılımcı kitlesi tarafından izlenmiştir. Bu sene ilk kez Nefroloji Tarihi oturumu gerçekleştirilmiştir. Anadolu Böbrek Vakfı adına Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Ayla SAN, “Safran ve Böbrekler Üzerine Etkileri” ve “Üroskopiden Ürinalize İdrar Muayenesinin Tarihi Gelişimi” konulu sözlü sunumlarla katılmıştır.

25 Mayıs 2018, Böbrek Hastalıklarında Yeni Yaklaşımlar, Yeni Mücadeleler, Yeni Fırsatlar konusu üzerinde 55. ERA-EDTA Kongresi Başkanı Bo Feldt-Rasmussen konuşma yapmıştır. Prof. Dr. Toni Cathomen tarafından yapılan “Gen Yönetimi: Nefroloji Araştırmaları ve Tedavi Yönünden Yeni Gelişmeler” konulu konuşma ile açılış töreni sona ermiştir.



ERA-EDTA 2018 ÖDÜLLERİ:

Daha sonra ERA-EDTA 2018 Ödül Töreni’nde ise Klinik Nefrolojiye Üstün Katkılarından dolayı Prof. Jürgen Floege, Temel Bilime Üstün Katkılarından Dolayı Prof. Hans-Joachim Anders, ERA-EDTA’ya Üstün Katkılarından Dolayı Prof. Andrzej Wieck ERA-EDTA 2018 ödülleriyle layık görülmüşlerdir. Dr. Shrikant Ramesh Mulay ise 2018 ERA-EDTA Stanley Shaldon Genç Araştırmacılar Ödülü’nü kazanmıştır.



55. ERA-EDTA Kongresi Hakkında Genel Bilgiler

55. ERA-EDTA Kongre-si’ne toplam 9598 kişi katılmıştır. Bunların 2711’i standlarda görevli olanlar ve ziyaretçilerdir. Kayıt yapanlardan %2’si Afrika, %22’si Asya, %3’ü Orta ve Güney Amerika, %3’ü Akdeniz’e sınırı olan ülkeler, %62’si Avrupa, %1’i Ortadoğu, %5’i Kuzey Amerika ve %2’si Okyanusya’dan katılmışlardır. Böbreğin Yeni Paradigmaları – KBH’de Vasküler Aksis Kemiği oturumu

2457 kişilik katılımı en fazla ilgi gören oturum olmuştur. T

oplantıya 2165 özet sunum gönderilmiş bunların 1788’i kabul edilmiştir. Sunum özetlerinin konuları şu şekildeydi; %14 Temel Bilimler, %41 Klinik Nefroloji, %29 Diyaliz, %11 Transplantasyon, %3 Padiyatrik Nefroloji, %1 Nefroloji Tarihi, %1 Hasta Eğitimi Araştırmaları ve Nefroloji Eğitimi.

55. ERA-EDTA Kongresi Gazeteleri (24, 25, 26 Mayıs 2018)



Toplantı her konuda oldukça doyurucu geçmiştir.

Rösem



Prof. Dr. Ayla SAN
Anadolu Böbrek Vakfı Bşk.

Türk Nefrolojisi’nin Attığı Mükemmel Adımlar

63. sayımızda 2018 yılında yapmış olduğumuz Dünya Böbrek Günü ile ilgili verileri sunduktan sonra aynı gün içinde aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle Yeditepe Üniversitesi’nin sunmuş olduğu “Nefrolojide Kadın Ayak İzleri” adında bir toplantıda ilk kadın Nefrolog olduğum için katılmış bulunmaktayım. Bu konuda görüşlerimi, yapmış olduğum çalışmaları dile getirdim. Türk Nefroloji Tarihi’ni yenileme çalışmaları içinde olan vakfımız, Renaliz gazetesinin 64. sayısını çıkarmış bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılı verilerini topladığımız zaman Türkiye’nin Nefroloji dalında çok büyük ilerlemeler gördüğü gözlen-

mektedir. 332 Özel, 57 üniversite, 471 Sağlık Bakanlığı’na bağlı toplam 860 diyaliz merkezi bulunmaktadır.

Cihaz sayısı; 16.675, hasta sayısı ise 59.558’e ulaşmıştır. Bu büyük bir rakamdır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre böbrek nakli çalışmaları; kadavra vericiden böbrek nakli sayısı 507, canlı vericiden böbrek nakli sayısı; 1.831, toplam; 2.338’e ulaşmıştır.

Bu hızda daha çok mesafeler alacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımızın devamını diliyorum.

A. SAN

Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz.

A. SAN



Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nin 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Anadolu Böbrek Vakfı En İyi Bildiri Ödülü



Anadolu Böbrek Vakfı En İyi Bildiri Ödülü'nü; Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları A.D., Kardiyoloji A.D. ve Nefroloji B.D. birlikteliği ile hazırlanmış olan Rana Tuna Doğrul, Belma Yaman, Ülver Derici, Şükrü Sindel tarafından hazırlanan "Son Dönem Böbrek Hastalığında Vücut Sıvı Kompozisyonu ile Ekokardiyografik Doku Doppler Ölçümleri Arasındaki İlişki" konulu çalışma kazanmıştır.

Ödül Prof. Dr. Ayla SAN tarafından Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülver DERİCİ eşliğinde Prof. Dr. Şükrü SİNDEL'e takdim edilmiştir.



Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN "ERA-EDTA Bilimsel Danışma Kurulu" üyeliğine seçildi.



Türk Nefroloji Derneği üyesi meslektaşımız Doç. Dr. Kültigin Türkmen, ERA-EDTA'nın Bilimsel Danışma Kurulu (Scientific Advisory Board) üyeliğine seçildi. <http://web.era-edta.org/sab>

Bu olay Nefroloji Dünyasını çok sevindirmiştir.

Bu kurulda ülkemizi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever ile birlikte temsil edecek olan Dr. Türkmen'i kutluyor ve başarılar ve bunun gibi güzel haberlerin devamını diliyoruz.

Renaliz

Avrupa Nefroloji Sertifikası Alan Hekimler

Türk Nefroloji Derneğimizin internet sayfasından öğrendiğimize göre; 2017 yılında yapılmaya başlanan Avrupa Nefroloji Sertifika sınavına giren ve başarılı olan;

- Dr. Cuma Bülent GÜL (2017 yılı),
- Dr. Melih ANIL (2017 yılı), Dr. Hakan AK-DAM (2018 yılı),



- Dr. Özant HELVACI (2018 yılı) ve
- Dr. Şehmuz ÖZMEN'i (2018 yılı) kutluyoruz.

Avrupa Nefroloji Sertifika sınavı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

<http://www.nefroloji.org.tr/content.php?id=77>

Renaliz

ANADOLU BÖBREK VAKFI Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Ayla SAN

Yayının Adı	: Renaliz Gazetesi
Yayının Türü	: Yerel, Süreli Yayın
Yayın Şekli	: 3 Aylık, Türkçe Baskı Tarihi: 1 Mayıs 2018
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü	: Mutlu GÜRLER
Düzeltilen	: Sibel ÖZKAN
Yayın İdare Merkezimiz	: Emek 29. Sok. (Eski 57. Sok.) Köşe Apt. 9/1 06510 - ANKARA
Telefon	: 0312 213 98 80 - 212 52 09
Faks	: 0312 213 79 02
e-mail	: aylan@anadolubv.org.tr, ayla.san@hotmail.com www.anadolubv.org.tr
Web Sitesi Güncelleştirme	: Adnan ŞENEL

Tasarım	: Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yay. Ltd. Sti. Konur 2 Sokak 57/4 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Telefon	: 0 312 425 07 34
Faks	: 0 312 425 07 36 www.hangarreklam.com
Baskı	: Öncü Basımevi Basım Yayım Tanıtım Ltd. Sti. Kazım Karabekir Caddesi Ali Kabakçı İş Hanı No:85/39 İskitler / ANKARA
Telefon	: 0 312 384 31 20 (pbx)
Faks	: 0 312 384 31 19 www.uncubasimevi.com

Gazetemiz Basın İlkelerine Uymayı TAAHHÜT EDER.





Özel Hemodiyaliz Merkezleri Olarak; Sayın Cumhurbaşkanımız'a Arzımızdır (Hürriyet Gazetesi, 24 Temmuz 2018, Sayfa 13) başlıklı yazıyı Hürriyet Gazetesi'nde görmem üzerine bu konuyu ele almayı düşündüm.

Yazının içeriği diyaliz merkezlerinin 2002'den günümüze kadar Euro değerlerine bağlı olarak diyaliz ücretlerinin düşmesi üzerine zor durumda oldukları dile getirilmiştir. Bunun üzerine DİYAMER (Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği)

Genel Sekreteri Sayın Dr. Gürkan YURTERİ'den bir yazı istenmiş, göndermiş olduğu yazı ilişikte sunulmuştur.



TÜRKİYE'NİN ÖZEL HEMODİYALİZ MERKEZLERİ OLARAK SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ'A ARZIMIZDIR.

Diyaliz Merkezleri Hakkında

Özel Hemodiyaliz Merkezleri Olarak; Sayın Cumhurbaşkanımız'a Arzımızdır (Hürriyet Gazetesi, 24 Temmuz 2018, Sayfa 13) başlıklı yazıyı Hürriyet Gazetesi'nde görmem üzerine bu konuyu ele almayı düşündüm. Yazının içeriği diyaliz merkezlerinin 2002'den günümüze kadar Euro değerlerine bağlı olarak diyaliz ücretlerinin düşmesi üzerine zor durumda oldukları dile getirilmiştir. Bunun üzerine DİYAMER (Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği) Genel Sekreteri Sayın Dr. Gürkan YURTERİ'den bir yazı istenmiş, göndermiş olduğu yazı ilişikte sunulmuştur.

DİYALİZ MERKEZLERİ ZOR DURUMDA

DİYAMER (Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği) üyeleri yirmibeş yıldır ülkemizde Diyalize giren 70 bin diyaliz hastasının %60'ının tedavisini yapmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği ve diyaliz sadece medikal bir problem değil aynı zamanda ekonomik bir problemdir. Ancak son zamanlarda artan kur ve buna paralel olarak artan hayat şartları nedeniyle maliyet geri ödemenin üzerine çıkmıştır. Derneğimizin yaptığı çalışmada bu maliyet dolar kuru 6,01 alındığında 308 TL'yi bulmuştur.

Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin diyaliz maliyeti 2015 de yapılan bir çalışmada yayınlanmıştır. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4642658/>) Bu çalışmada, Dr. Mehmet Şükrü Sever'in de içinde olduğu bir grup tarafından yapılan çalışmanın verileri kullanılmıştır. Bu çalışmada hastabaşı maliyet 2004 dolar kuruna göre yıllık hesaplanmıştır.

Hemodiyaliz için 28,399,77 bulunmuştur. Hatta bu çalışmada birçok parametre çalışmaya ilave edilmemiştir (Tıbbi atık, Sağlık Kalite Giderleri, hasta servis, elektrik, su, doğalgaz, sterilizasyon...). Bugünkü kura uyarladığımızda tek seans bedeli 387 TL bulunmuştur. İlaç bedeli ve hastane yatış bedeli düşüldüğünde hemen hemen bizim bulduğumuz 308 TL ye yaklaşmaktadır. Bundanda anlaşıldığı gibi hemodiyaliz için yapılan maliyet çalışmalarında kur farkı uygulandığında esasen bir fark bulunmamaktadır. Bundan sonra yapılan çalışmalarda bunu teyit edeceği aşikardır.

Bu çalışmada, 2004 yılı Amerikan Doları ortalama kuru 1.429 TL dir. Bugün için kur 6.01 dir.

Yani Dolar bazında ödenen ücret $(6.01/1.429=4.205 \cdot 28399,77/4.205=6753)$ 6753 Amerikan Dolarına gerilemiştir. Ödenen ücret Mısır ve Çin'in altına düşmüştür.

Bugün yapılan geri ödemeyle hemodiyaliz tedavisinin yapılamıyacağı kesindir. Bugün bir diyaliz hastası merkezi tarafından evinden alınıyor, tıbbi tedavisi yapılıyor, doktor muayenesi ve konsültasyonları yapılıyor, beslenmesi sağlanıyor yine servisle evlerine bırakılıyor.

Tüm bu ekonomik sıkıntılara rağmen yaptığımız diyaliz kalitesi Avrupa standartlarındadır (TND verisi). Birçok

diyaliz merkezi tıbbi sarflarını ödeyememekte vadelerini bir yılın ötesine uzatmaktadır. Sürekli kredi alarak merkezlerini ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. Derneğimizi hergün arayan merkez sahipleri bir umut arayışına girmişlerdir.

Çözüm ne olmalıdır?

- Nefroloji Dernekleri, Diyaliz Dernekleri birlikte hareket etmelidir. Ortak kararlar hareket etmeli ve sektörün sorunlarını tek ağızdan ilgili makamlara aktarmalıdır.
- Maliyet düşürülmeli ve kurumun geri ödemesi enflasyona göre ayarlanmalıdır.

Maliyet düşürme önerileri:

- Hasta servis işlerinin belediye tarafından üstlenilmesi, diyaliz otobüsü projesinin gündeme alınması,
- Reuse yapılmasına izin verilmesi,
- Elektrik, su ve vergide, tıbbi atıkta indirim uygulaması,
- Hasta sevklerinin bölge içerisinde sıraya konulması (istendiği takdirde bununla ilgili yazılımı yaptırabiliriz)
- Diyalizde tam gün doktor zorunluluğunun kaldırılması (birçok ülkede sürekli doktor istihdamı bulunmamaktadır). Ev hemodiyalizinde de doktor bulunmamaktadır. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.
- Ağır ve engelli hastaları Eğitim Araştırma Hastanelerinde diyalize alınmalıdır.

Türk Nefroloji Derneğinin desteğiyle yaklaşık 40.000 diyaliz hastamızın diyalizini kaliteden ödün vermeden yapmak istemekteyiz. Bu konuda katkılarınızın olacağına inancımız tamdır.

Saygılarımızla

Dr. Gürkan YURTERİ

DİYAMER Genel Sekreteri



'BLUE ZONES', TAŞ DEVRİ VE TANSİYON



Prof. Dr. Tekin AKPOLAT
Liv Hospital-İSTANBUL
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
11 Mayıs 2018
www.tekinakpolat.com

Plan

- Blue Zones
- Sahte Blue Zones
- Blue Zones tansiyon çalışmaları
- İleri yaş tansiyon çalışmaları
- Taş Devri
- Blue Zones çözümleri ve Okinawa paradoksu
- Özet

Blue Zone (Mavi Bölge)

- İlk kez National Geographic Dergisi muhabiri Dan Buettner tarafından Dünyada ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu beş bölge için kullanılmıştır.



Mavi Bölge

- Bu bölgelerin özellikleri insanların sağlıklı ve uzun yaşamalarıdır, 100 yaşın üzerinde (Centenarians) çok insan vardır. Bu bölgelerde nüfus kayıtları güvenilir olduğu için insanların 100 yaş iddiaları kanıtlanmıştır.

Sahte? Mavi Bölge

- Nüfus kayıtlarının güvenilir olmadığı Kafkaslarda Abhazya, Ekvator'da And dağlarında Vilcabamba, Pakistan'ın kuzeyinde bulunan Hunza gibi bölgelerde de insanlar sağlıklı ve uzun yaşamaktadır ama 100 yaş üzerindeki insan sayısı konusunda şüpheler vardır, **bu nedenle Mavi Bölge olarak tanımlanmamıştır.**

Stamatis Moraitis

- Bu yazıyı yazdığımda Moraitis 97 yaşında ve son derece sağlıklıdır
- Adaya dönüş yaptıktan 25 yıl sonra kendisine teşhis koyan doktorlara bunun nasıl olabileceğini sormak için Amerika'ya hastaneye gider ve aldığı yanıt ise oldukça ilginç olur: 9 doktorun 9'u da çoktan vefat etmişlerdir.

Ikaria

- İnsanlar geç uyanıyorlar.
- Sabah 11'den önce iş yerlerini açmıyorlar çünkü o saate kadar kimse uyanmıyor.
- Muhakkak öğlen uykusuna yatılıyor.
- Adada hiç bir kimsede saat bulunmuyor. Söylenenlere göre evinize davet ettiğiniz arkadaşınız öğlen 12'de de gelebilir, akşam üzere 6'da da.

Okinawa

- Hawaii'ye benziyor
- Okinawalıların savaş dönemi yokluğunda tükettikleri üç besin: Tatlı patates, zerdeçal ve yosun
- Goya denilen acı kavun

Sardinya

- Yaşam süresi en uzun erkekler
- Adanın yokuşlu yolları her yere yürümek zorunda olan adalılara hayat boyu egzersiz yapma imkânı veriyor.
- En çok tükettiği ekmek, yüksek proteinli, düşük glutenli durum buğdayından yapılan bir tür lavaş ekmeği.

Loma Linda

- Sebebi şehirde yoğun yaşayan, Hristiyan Yedinci Gün Adventist Kilisesi mensupları
- Rejimleri bitki tabanlı; balık ve süt ürünlerini az tüketiyorlar; sigara içmiyorlar; kilolarını muhafaza ediyorlar; haftada dört beş defa bir avuç dolusu yemiş yiyorlar; düzenli idman yapıyorlar.

Nikoya (Kostarika)

- Diğer Mavi Bölge insanları gibi düşük kalorili, düşük yağlı ve bakliyat açısından zengin bir diyet
- Geleneksel olarak en çok fasulye yiyorlar.
- Mısırdan yaptıkları tortilla ve tropikal meyveler de rejimin içinde.

Sahte Blue Zones

- Kafkaslarda Abhazya
- Ekvator'da And dağlarında Vilcabamba
- Pakistan'ın kuzeyinde bulunan Hunza
- İnsanların uzun, sağlıklı ve mutlu yaşadığı diğer bölgeler

Karbonhidrat oranı

- Abhazya %65
- Vilcabamba %74
- Hunza %73
- Aldıkları kalori günlük 1800-1900

Bitkisel kaynak

- Abhazya %90
- Vilcabamba %99
- Hunza %99

Mavi Bölgeler

- Tansiyon açısından ne öğrenebiliriz
- Ama önce ne durumdayız
- PATENT2

Patent2 (80 yaş üzeri)

- Ortalama sistolik/diyastolik: 142/73
Erkeklerde biraz daha yüksek
- Prevalans %76
Kadınlarda daha sık

Implications from and for food cultures for cardiovascular disease: longevity (Suzuki ve ark)

- 341 Centenarians
 - 62 erkek, 279 kadın
 - Kan basıncı yüksek: Erkek %39, Kadın %38
 - Ortalama kan basıncı
- Erkek: 132/71, Kadın: 130/73

Patent 2: 142/73 (>80 yaş)

Implications from and for food cultures for cardiovascular disease: longevity (Suzuki ve ark)

- Çoğunda tuz için tat duyusu gelişmemiş
- Kalp hastalığı ve inme Japonya ortalamasının çok altında



Mildly elevated blood pressure is a marker for better health status in Polish centenarians

- Polonya’da yaşayan 86 centenarian (16 erkek, 70 kadın), ortalama KB 150/77
- 180 gün takip edilmişler
- Yaşayanlarda sistolik KB, diyastolik KB ve nabız basıncı daha yüksek
- SKB ≥ 140 , DKB ≥ 90 , OAB ≥ 100 ve NB ≥ 40 mmHg ile 180 gün yaşama şansı daha fazla
- Hafif yüksek tansiyon yararlı olabilir

Amerindian ancestry and extended longevity in Nicoya, Costa Rica (2017)

- 20 kişi (≥ 99 yaş)
- Ortalama KB: 142/75 mmHg
- Patent 2: 142/73 (>80 yaş)

Predicting mortality with biomarkers: a population-based prospective cohort study for elderly Costa Ricans (2012)

- Ortalama yaş 80
- 80 yaş üzeri 1300 kişi var
- Ortalama kan basıncı 144/84

Patent 2: 142/73 (>80 yaş)

Beyond Meatless, the Health Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts (2014)

- Adventist Mortality Study (AMS)
- Adventist Health Study-1 (AHS-1)
- Adventist Health Study-2 (AHS-2)

Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? (Fraser 2009)

Diet group	BMI ²	Diabetes ²	Hypertension ²
Nonvegetarian	28.26 (28.22, 28.30)	1.00	1.00
Semivegetarian	27.00 (26.96, 27.04)	0.72 (0.65, 0.79)	0.77 (0.72, 0.82)
Pescovegetarian	25.73 (25.69, 25.77)	0.49 (0.44, 0.55)	0.62 (0.59, 0.66)
Lactoovo-vegetarian	25.48 (25.44, 25.52)	0.39 (0.36, 0.42)	0.45 (0.44, 0.47)
Vegan	23.13 (23.09, 23.16)	0.22 (0.18, 0.28)	0.25 (0.22, 0.28)
p ²	0.0001	0.0001	0.0001

Tsimane

- Amazon bölgesinde yaşıyorlar kalp hastalığı ve tansiyon yok
- Hem tarım hem avcılık yapıyorlar.
- Kalorilerinin yani enerjilerinin büyük bir kısmı karbonhidrattan (%72), kalanı protein ve yağ.

Yanomamo

- Dünyada en az tuz yiyen toplumdur, yüksek tansiyon görülmez.
- Tuz ve tansiyon ilişkisini araştıran çalışmalara büyük katkıları olmuştur.
- Erkeklerin nerdeyse yarısında ölüm nedeni komşular ile savaş.



Coronary atherosclerosis in indigenous South American Tsimane: a cross-sectional cohort study (Lancet 2017)

- 40 yaş büyük 705 hasta (çoğu >55)
- Koroner arter kalsiyum skoru belirgin düşük
- Ortalama LDL 91
- Ortalama HDL 40

Coronary atherosclerosis in indigenous South American Tsimane: a cross-sectional cohort study (Lancet 2017)

- Şişmanlık, yüksek şeker ve sigara kullanımı çok az
- Hipertansiyon sıklığı %5
- Yüksek sensitif CRP > 3 mg/dl oranı %51 yani inflamasyon var
- Temiz su yok, 2/3 sürekli bağırsaklarda solucan var

Okinawa paradoksu

- Gençlerde ise böyle değil
- Beslenme değişti: Yağlı ve işlenmiş gıda çok fazla
- Kolesterol düzeyleri artmaya başlamış
- Şimdi Japonya ortalamasına göre koroner arter hastalığı riskleri artmış durumda

Özet 1

- Uzun yaşayanlar vücutlarında öyle bir denge kurmuşlar ki hem çok hareket ediyorlar hem az yiyorlar ve kilo veremiyorlar (Muhtemelen uzun yaşayan kaplumbağa gibi metabolizma hızları düşük).
- Az yemelerine rağmen kilo vermiyorlar ama kilo da almıyorlar.

Özet 2

- İleri yaşlarda tansiyon konusunda yapılan çalışma ve bilgi sınırlıdır
- Uzun yaşayan insanlarda hipertansiyon vardır ama çok sık değildir
- Uzun yaşayan insanlar büyük ölçüde bitkisel kökenli ve işlenmemiş/doğal gıdalar ile beslenmektedir

Özet 3

- Akdeniz tipi beslenme ve vejeteryan diyet ön plana çıkmaktadır
- Tuz tüketimleri çok azdır
- Popüler diyetlerin, ilginç/ilgi çekmeye yönelik çıkışların toplum sağlığına olumsuz etkilerinin olması kaçınılmazdır

Özet 4

- İleri yaşlarda diyastolik kan basıncının düşük olması önemli/risk faktörü
- Sistolik düşürüp diyastolik etkilemeyecek en etkin yöntem: Tuz kısıtlaması?
- Hastalık yoktur hasta vardır

Akea=100 yaşa
(May you live to be 100,
Sardinya’dan)

www.tekinakpolat.com


TINY HEARTS HIT BY THE WAR: KIDNEY DISEASE PROFILE IN SYRIAN REFUGEE CHILDREN



Tiny hearts hit by the war: Kidney disease profile in Syrian refugee children

Ayşe Balat, MD
İstanbul Aydın University, School of Medicine
Department of Pediatric Nephrology & Rheumatology

4th Congress of the Mediterranean Kidney Society (MKS),
20-22 April 2018, Mostar, Bosnia and Herzegovina



Introduction

- War in Syria has cost thousands of lives,
- Injured and displaced many...
- Turkey is the largest refugee hosting country worldwide
- The Turkish Government's Disaster Emergency and Management Agency states that nearly 3 million Syrian live in and outside the camps and in provinces of Turkey

Disaster and Emergency Management Agency of The Turkish Government, <http://www.afad.gov.tr>



Table C4.1 The Number of Syrians in Turkey by Provinces (May 29, 2017)					
Province	Camp Settling	Non-Camp Settling	Total	Province	Camp Settling
Adana	0	453,495	453,495	Adana	0
Antalya	122,409	319,132	441,541	Antalya	0
Diyarbakir	16,274	349,898	366,172	Diyarbakir	0
Total	122,409	2,153,521	2,275,930	Total	0

- Gaziantep University is one of the biggest centres for Syrian refugees healthcare
- Most chronically-ill children have been admitted to the hospital, because of a border with Syria
- Although preventative nephrology is the most effective way of managing young renal patients, it is difficult to administer in harsh working and living conditions

28.08.18 Ayşe Balat, MD 6



28.08.18 Ayşe Balat, MD 9

- The prevalence of hypertension in children has been reported to be approximately 1-3% (4th Report)
- Hypertension prevalence (preHT/HT) is increasing in children
- *6.1% in Turkey
- Brazil 17.3%
- Canada 7.4%
- Greece 12.3-15.1%
- India 10.1%
- Iran 7.7%
- South Africa 1-11.4%
- Taiwan 12.9%
- USA 13.8%
- Italy 10.1%

*Düzova et al. NDT 2013
Feber J et al. Clin Sci 2010

28.08.18 Ayşe Balat, MD 12

- We needed to evaluate our data, as one of the closest center to these children (September 2012 to January 2015)*.
- Considering the limited data regarding the kidney disease profile of children in Middle-East**, we thought that renal diseases in refugee children may provide information to care for affected children in our environment and other places.

*Akbalik Kara M, Demircioglu Kilic B, Balat A, Iran J Kidney Dis 2017

**Saeed MB, Saudi J Kidney Dis Transpl 2005

28.08.18 Ayşe Balat, MD 15



28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD 18

28.08.18 Ayşe Balat, MD

TINY HEARTS HIT BY THE WAR: KIDNEY DISEASE PROFILE IN SYRIAN REFUGEE CHILDREN

The findings demonstrated the increased prevalence of kidney disease in our environment, since the rising admission of refugee children to our clinic due to the ongoing war

122 new admissions in 2016 and 2017

Disorders	2012-2015 (n=130)	2016-2017 (n=122)
Congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT)	34 (26.2)	19
Chronic kidney disease (CKD)	30 (23.1)	15
Nephrotic syndrome	24 (18.5)	20
Enuresis	12 (9.2)	9
Urolithiasis	9 (6.9)	15
Acute glomerulonephritis	5 (3.8)	3
Acute kidney injury	4 (3.1)	41
Others	12 (9.2)	

Table 8. Comparison of Kidney Disease Profiles in Asian Countries

Characteristics	Lapato et al	Markovic et al	Kari et al	Samir	Current Study
Study Population	25 (22.5%)	27 (21.7%)	3 (13.0%)	26 (19.7%)	26 (19.7%)
Gender distribution	16 (63.0%)	16 (59.3%)	3 (23.1%)	16 (60.0%)	16 (60.0%)
Age distribution	21 (84.0%)	24 (88.9%)	3 (23.1%)	26 (100.0%)	26 (100.0%)
Primary diagnosis	16 (63.0%)	16 (59.3%)	3 (23.1%)	16 (60.0%)	16 (60.0%)
Secondary diagnosis	10 (40.0%)	11 (40.7%)	0 (0.0%)	10 (38.5%)	10 (38.5%)
Other	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

Table 7. Overall prevalence of Chronic Kidney Disease (CKD) and End-Stage Renal Disease (ESRD) in Syrian Refugee Children

Stage	Number of Patients	Percentage
CKD	30	24.6%
ESRD	12	9.8%

Unfortunately, they have been admitted to hospital after the beneficial periods of early diagnosis, mostly in emergency situations, and when the problem is huge...

Figure 8.1.1 Access of Syrians to the Health Services in Turkey

Access to Health Services	Yes	No
Access to Health Services	100%	0%

Figure 8.1.2 Satisfaction Rates of Syrians With Regards to the Health Services They Enjoyed in Turkey

Satisfaction Rate	Yes	No
Satisfaction Rate	100%	0%

Figure 8.1.3 The Reasons Why Syrians Living in Non-Camp Settings Did Not Use Health Services

Reasons	Yes	No
Reasons	100%	0%

Table 8.1.1 Access of Syrians to the Health Services in Turkey

Access to Health Services	Yes	No
Access to Health Services	100%	0%

Conclusion-1

CAKUT and CKD are highly prevalent in Syrian refugee children.

Although healthcare expenditures are provided, the continuing political crisis and instability would increase the number of admissions, and affect the children's quality of life in a different environment from their home country.

Conclusion-2

Most of them do not have previous medical records and/or information, making difficult to understand and solve their problems.

Despite all our efforts in such a difficult conditions to provide the best healthcare, the number of patients coming for regular follow-up remains low. This is one of the main problems to be resolved.

"If you lose your way one day, look into the eyes of a child; because there are always three things a child can teach an adult:

- To be happy for no reason,
- To always be busy with something,
- and to know how to demand which he desires."

Paulo Coelho

I would like to thank all my colleagues providing optimal healthcare to these children in every condition;

Mithat Büyükelik

Beltinge Demircioğlu Kılıç

Mehtap Akbalık Kara

All my colleagues in Department of Pediatrics

Mediterranean Kidney Society (MKS)

Ayşe Balat, MD

President of MKS

4th Congress of the Mediterranean Kidney Society (MKS), 20-22 April 2018, Mostar, Bosnia and Herzegovina

History of MKS-1

2005, Spring

The idea of a society of nephrology devoted to study the specific problems affecting the countries on the shores of the Mediterranean Sea was firstly nurtured by Prof. Guido Bellinghieri and Prof. Natale G De Santo.

Mediterranean Renal Association (MERA) was founded and a scientific international event was organized on October 23, 2005, as part of the 7th Taormina Course

Main speakers were nephrologists from Italy, Egypt, Slovenia, Israel, and Morocco. Mutual discussions generated the conviction that a Mediterranean Kidney Society would better serve the interest of nephrologists working in the Mediterranean area

History of MKS-2

The next step was the merging of MERA with MENE (Mediterranean Nephrology Association) a Sicily based society.

The Societies merged into the "Mediterranean Kidney Society", logo mks abbreviated as MKS (in Italian Società Mediterranea del Rene).

The notary document was prepared in Siracusa (with the help of the Notary, Dr. Annio De Luca, on June 26, 2009)

The agreement was signed by Guido Bellinghieri, and Natale G De Santo, for MERA and by Giuseppe Daidone, Pasquale Fatuzzo, Salvatore Gianni, Maurizio Li Vecchi, Silvio Maringhini for MENE. They all are from then on recognized as the 'Founders of MKS' lifelong.

1st Congress of MKS- Giardini Naxos-Taormina, Sicily

October 2-4, 2009 - Russott Hotel

Prof. Guido Bellinghieri and Prof. Natale G De Santo (organisers)

Algeria, Morocco, Tunisia, Libya, Egypt, Israel, Turkey, Greece, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Slovenia, Macedonia, Montenegro, Italy, France, Spain, Malta, Serbia, San Marino, Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, Slovak Republic

The Council of the MKS

- Guido Bellinghieri (President),
- Natale Gaspare De Santo (Secretary),
- Rashad Barsoum (Egypt),
- Athanasios Diamandopoulos (Greece),
- Mohammed Benghamen Gharbi (Morocco),
- Batya Kristal (Israel),
- Radoslav Kveder (Slovenia),
- Mohamed Aziz El Matri (Tunisia),
- Mariano Rodriguez (Spain),
- Yahya Saglikler (Turkey).

The Council of Representatives

- Alessandro Balducci (San Marino),
- Jadranka Buturovic Ponikvar (Slovenia),
- Rim Goucha-Louzir (Tunisia),
- Petar Kes (Croatia),
- Tahar Rayane (Algeria),
- Halima Resic (Bosnia & Herzegovina),
- Antonio Santoro (Italy),
- Giovanni Gambaro (Vatican),
- Emanuel Farrugia (Malta)

2nd Congress of MKS- Milazzo (ME), Italy

April 12-14, 2013

Prof. Biagio Ricciardi (Congress President- Chairman of the Division of Nephrology at the Milazzo General Hospital)

Italy, Algeria, Egypt, Turkey, Greece, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Slovenia, France, Spain, Malta, Germany

The Council of the MKS -2013-2015

- Guido Bellinghieri (President),
- Natale Gaspare De Santo (Secretary),
- Ayşe Balat (President Elect)
- Athanasios Diamandopoulos (Greece)
- Batya Kristal (Israel)
- Tarek Fayad (Egypt)
- Mohamed Aziz El Matri (Tunisia)
- Radoslav Kveder (Slovenia)
- Mariano Rodriguez (Spain)
- Yahya Saglikler (Turkey)

The Council of Representatives

- Alessandro Balducci (San Marino)
- Jadranka Buturovic Ponikvar (Slovenia)
- Rim Goucha-Louzir (Tunisia)
- Petar Kes (Croatia)
- Tahar Rayane (Algeria)
- Halima Resic (Bosnia & Herzegovina)
- Antonio Santoro (Italy)
- Giovanni Gambaro (Vatican)
- Emanuel Farrugia (Malta)

3rd Congress of MKS- Cappadocia, Turkey

June 10-13, 2015

Prof. Ayşe Balat (Congress President)

Turkey, Italy, Algeria, Egypt, Greece, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Tunisia, Libya, France, Spain, Poland, USA

The Council of the MKS (2015-2019)

- Ayşe Balat (President)
- Halima Resic (President Elect)
- Guido Bellinghieri (Past President),
- Natale Gaspare De Santo (Secretary),
- Castas Fourtanas (Greece)
- Abdulhafid Shebani (Libia)
- Tarek Fayad (Egypt)
- Fatma Ben Mousa (Tunisia)
- Vincenzo Savica (Italy)
- Biagio Ricciardi (Webmaster)

The Council of Representatives

- Rümeysa Kazancıoğlu (Turkey)
- Jadranka Buturovic Ponikvar (Slovenia)
- Jamil Hachicha (Tunisia)
- Sanjin Rachi (Croatia)
- Tahar Rayane (Algeria)
- Enisa Mesic (Bosnia & Herzegovina)
- Emanuel Farrugia (Malta)
- Banu Sadıkoğlu (North Cyprus)

4th Congress of Mediterranean Kidney Society was held on 20-22 April 2018, Bosnia and Herzegovina, Venue Hotel Mepas.

Saffron and Its Effects on Kidneys



Prof. Dr. Ayte SAN

24th-27th, May 2018

Saffron and Its Effects on Kidneys

- INTRODUCTION AND AIMS:** A study which examines the effects of saffron, the oldest medicinal plant, on kidneys.
- METHODS:** Review of published literature on saffron and its effects on kidney diseases.

kidney healthy web
www.kidney-healthy.com

RESULTS:

- Saffron is derived from the stigmas of *Crocus sativus* L. Flowers and its cultivation goes back to about 2300 B.C.
- A definite identification of saffron crocuses dates from about 1700-1600 B.C.



- In the 4th century B.C., the principal area of cultivation was at Corycos in Cilicia. Its name from the plant, as did the names of Krokos in Greece

GREECE



Kozani (Krokos)

- Safranbolu in Turkey

TURKEY



Safranbolu, Turkey

- Saffron Walden in England.

UNITED KINGDOM



- Saffron and its constituents are widely used as spice and medicinal plant in folk medicine.
- The Ebers papyrus (ca 1550 B.C.) mentions saffron as an ingredient in a cure for kidney problems (Woenig, 1886)



Ebers Papyrus

Historian
Georg Ebers
(1837-1898)

Stigmas of Saffron

- In Unani medicine, saffron is used to **reduce inflammation of enlarged liver and in infection of the bladder and kidneys.**
- The effect of saffron extract may be related to the **antioxidant properties and its reducing blood glucose level and radical scavenging effect.**
- In ancient cultures, saffron was used to relieve **kidney stones** and also as an agent in improving the circulation of blood.



Photograph by A.San

- The main compounds in saffron are **crocin, picrocrocin and safranal.**
- Since ancient times, saffron has been used as a part of **religious rituals, folk medicine and cuisine.**



- The active components in saffron have many therapeutic applications in many traditional medicines as **antiseptic, antidepressant, antioxidant, digestive, and anticonvulsant.**

- Some recent studies have shown that saffron has possible **anti-carcinogenic, anti-mutagenic, and immune-modulating effects** mainly resulted from antioxidant-like agents of saffron such as **volatile agents (e.g., safranal), bitter principles (e.g. picrocrocin), and dye materials (e.g., crocetin and its glycoside, crocin).**



HEALTH BENEFITS OF SAFFRON

- Helps with weight loss
- Reduces food cravings
- Suppresses appetite/increases satiety
- Powerful antidepressant
- Fights Alzheimer's disease
- Reduces anxiety
- Blocks the sexual side effects of SSRIs
- Reduces symptoms of OCD
- Fights cancer cells and tumor growth
- Antioxidant
- Prevents heart disease
- Helps combat eye conditions
- Pain reliever
- Improves digestion
- Lowers blood pressure
- Protects retina from damage
- Slows progression of macular degeneration and retinitis pigmentosa
- Fights respiratory disease
- Possible aphrodisiac



Health benefits of Saffron.

Treats asthma, menstrual cramps, depression, atherosclerosis, insomnia and whooping cough. Improves pulmonary oxygenation.

Lowers bad cholesterol. Alleviates anxiety & depression and it rejuvenates the mind.



SAFFRON TEA FOR PSORIASIS

- Saffron tea 100% natural Saffron AAAAA Crocus
- Chinese Flower tea Endocrine conditioning skincare
- Crocus Stigma herbal tea





HEALTH BENEFITS OF SAFFRON

www.GreenTidings.org www.FBI.com/GreenTidings

Powerful antidepressant
Fights Alzheimer's Disease
Reduces anxiety
Blocks the sexual side effects of SSRIs
Reduces symptoms of OCD
Reduces food cravings
Suppresses appetite/cachexia/cancer
Helps with weight loss
Fights cancer cells and tumor growth
Possible Aphrodisiac

Antiemetic
Prevents heart disease
Helps combat eye conditions
Protects retina from damage
Slows progression of macular
degeneration and retinitis pigmentosa
Pain reliever
Improves digestion
Lowers blood pressure
Fights respiratory diseases

* SSRI: selective serotonin reuptake inhibitors
** OCD: obsessive-compulsive disorder



Saffron extract and its active constituents; «crocin, picrocrocin» are known to have an overall protective effect against kidney ischemia/reperfusion injury.

These may be useful agents for the prevention of renal ischemia-reperfusion (IR)-induced oxidative injury in rats.



Saffron and its carotenoid crocin could be potentially useful in diabetic nephropathy treatment.

Safranal was found to reduce dysfunction (lowered BUN and CREA levels) and tissue damage that occur in renal tissue, by means of its both antioxidative and anti-inflammatory activities.

In the light of these results, it's suggested that safranal contributes to the development of new treatment protocols in the treatment of type 2 diabetes and its complication diabetic nephropathy.







Briefly;

Saffron as a harmless substance can increase renal blood flow and can play the diuretic role in the diagnosis and treatment of many diseases like glomerulonephritis or localization of antigen-antibody complexes in the renal glomerulus.

Antioxidative and anti-inflammatory activities and protective effects for the hydro-ethanolic extract of saffron is clear and therefore it can be used in ischemic conditions due to its diuretic effect.





Saffron Extract



Nowadays, a lot of research is done on applications of this precious spice in the treatment of numerous human and animal ailments.

El daly (1998) found that daily supplement of the aqueous extract reduced the nephrotoxicity of the chemotherapy, slowing down the renal excretion.



Genitourinary:

The aged rats exhibited a dysregulation of the oxidative stress, and inflammation in the kidneys, but crocin treatment significantly reduced the expression of the inflammatory genes.

These results provide pivotal documentation that crocin has renoprotective effects against the development of oxidative stress and inflammation in the kidney of old rats.



Safranbolu Saffron Harvest Festival 2017


Every year Saffron Harvest Festival is celebrated in Safranbolu.

On 9th November 2017, the 18th Saffron Harvest Festival was celebrated which started with a «Painting and Photography Exhibition» followed by the opening of the Saffron Statue.

This year the 19th Festival is to be celebrated on same day in same place.







Saffron has had many different uses such as being used as a food additive along with being a palliative agent for many human diseases. Thus, as an important medicinal herb, it is a good candidate with many promising potentials to be considered for new drug design.

2011 Trade Science Inc. - INDIA





Saffron Festival in Safranbolu





Harvest of Saffron in Safranbolu, Turkey.



As Result;

It is a diuretic;

It can purify kidney and bladder.

If used with honey, it can facilitate passage of renal stone.

By putting one stigma in urethra, it can cure obstructed urination.



CONCLUSION: It can be concluded that saffron can act as a diuretic and purifies the blood, kidney and bladder, and may regulate the BUN and sCr rate in blood.



I believe that more emphasis should be made on saffron and its benefits on kidneys.





Harvest of Saffron in Iran.





A saffron field in Safranbolu.





A saffron farm in Safranbolu.



THANK YOU




My homeland Gümüşhane is a province in northern Turkey.
Saffron; Gümüşhane, Turkey, 1995, Photo by A. San




When I took this photo, I didn't know that it was saffron. Now I am very glad to learn it.

VAKALAR İLE
HEKİMİN HUKUKİ
SORUMLULUĞU

Avukat Ece SİNDEL

HEKİMLERİN
SORUMLULUĞUHEKİMİN CEZAI
SORUMLULUĞUHEKİMİN İDARİ
SORUMLULUĞU

- Hekimlerin idari sorumluluğunun ortaya çıkabilmesi için; kamu hastanelerinde çalışması şarttır.
- Kamuya ait hastaneler; yurttışlara kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla kurulmuş ve devlet idaresi içinde yer alan kuruluşlardır.
- Kamu hastanesinde çalışan hekime karşı direkt dava yoluna gidilemez, öncelikle idareye başvurulmalıdır.

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN
KAYNAKLARISorumluluk; hukuka aykırı olarak meydana
getirilen


zararların üstlenilmesidir.

- Tıbbi müdahale; en basit tıbbi tedaviden en ağır cerrahi ameliyatlara kadar uzanan ve kişilerin sağlığına yönelik tüm tıbbi uğraşları kapsar.
- Bir fiilin tıbbi müdahale sayılabilmesi için deri bütünlüğünün bozulması gerekmez. Hastalık önlenmesine ilişkin tedaviler buna en uygun örneklerdir.

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN
SORUMLULUK

- Hekim ile hasta arasında önceden açık veya zımni kurulmuş bir "Tedavi Sözleşmesi" olmalıdır.
- Tedavi sözleşmesi için; biçim şartı yoktur.
- Sözleşmenin hekim tarafından ihlal edilmesi gerekmektedir.

- Hekimin hukuki sorumluluğunda, **kusursuzluk** esas alınmaktadır.
- Hekimin hukuki sorumluluğunun dayanağını; tıbbi teşhis ve müdahaleyi içeren tedavi sözleşmesinin kapsamı ve sonuçları oluşturur.

Tıbbi Yardım ve Müdahaleden
Doğan Hukuki Sorumluluğun
Belirlenmesinde;Tedavi Sözleşmesinin İhlali
Nedeniyle Hekim
Sorumluluğu ŞartlarıTEDAVİ
SÖZLEŞMESİ

Hekimin tıbbi müdahale nedeniyle sorumluluğu kural olarak "sözleşmeden dolayı" sorumluluğudur. Sözleşme için kabul edilen görüş ise; doktrinde vekalet sözleşmesi niteliğinde olduğudur. İstisnai durumda; eser (istisna) sözleşmesi niteliğindedir.

Tedavi Sözleşmesinin Eser (İstisna
Sözleşmesi)Niteliği Taşıması
Halleri;

- Diş protezi, köprü ya da kron yapımı,
- Takma göz, kol, bacak gibi yapay organların takılması,
- Burun vb. güzelleştirici estetik ameliyatlarda hekim belli bir sonucu gerçekleştirmeyi borçlandığı için **ESER SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDEDİR**.
- Eser sözleşmesindeki esas amaç; işin ayıpsız olarak yapımı ve teslimidir.

HEKİMİN HAKSIZ FİİL
SORUMLULUĞU


- Haksız fiil; kişinin diğer kişilere karşı zarar verici nitelikte davranışdır.
- TBK md.49'dan itibaren düzenlenmiş olup; "kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zarar gidermekle yükümlüdür."
- TBK md.50; zarar gören; zarar ve zarar verenin ispatla yükümlüdür.
- Hekimin, sözleşme dışı kusura dayanan sorumluluğu haksız fiil sorumluluğuna girmektedir.
- Hukuka aykırılık, kusur, zarar, illiyet bağı olmalıdır.

Hekimin haksız fiillerinden dolayı kusuru belirlenirken;

- Hekimin hastaya verdiği değer ve gösterdiği ilgi,
- Meslek koşullarını yerine getirip getirmediği,
- Tıp bilimi kurallarını gözetme ve uygulamadaki tutumu,
- Tıbbi müdahaleden önce alınması gereken tüm önlemleri alıp almaması,
- En küçük aksamalara yer açacak durumlarda, gerekli araştırmaları yapma, önlem alma, hastanın özelliklerine göre en uygun tedavi yöntemlerini seçme konusundaki yaklaşım ve becerileri göz önünde tutulmalıdır.

Asistanlar; "eğitim gören" konumunda bulunduklarından
dolayı uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren tıbbi
uygulamaları **TEK BAŞLARINA YAPMALARİ
UYGUN DEĞİLDİR.**

- Her kurum; asistan eğitimlerini; öğretim görevlisi, baş asistan ve uzman sayısına göre planlaması gerekmektedir. bir öğretim görevlisi, başasistan veya uzman birden fazla asistana nezaret edecek şekilde eğitimler organize edilebilir.
- Asistana nezaret eden ilgili öğretim görevlisi, başasistan ve uzmanın bilgisi ve değerlendirmesi bulunmadan hastalara tedavi planlanmayacaktır. Hastalara yapılan uygulamalar ile planlanan tedavilerden, asistana nezaret eden ilgili öğretim görevlisi, başasistan ve uzmanın sorumlu olduğunun Sağlık Bakanlığı tarafından genelle ile hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

Örnek Vaka; "Tümörülü böbreği
yerine diğer böbreği
çıkarılan hasta"Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu
İçin;

- Subjektif ölçü; hekimin müdahaleyi yapmaya yetkili olması,
- Objektif ölçü; hekimin müdahale sırasında tıp biliminin kabul ettiği güncel veriler ışığında hareket etmiş olmasıdır.
- Hastanın hekim tarafından tıbbi müdahalenin riskleri ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgilendirilerek aydınlatılmış onamının da alınması gerekmektedir.

Tedavi sözleşmesi; kural olarak hastanın muayene ve tedavi olmak için hekime başvurusu, hekimin de hastayı muayene etmeyi kabul etmesiyle başlar.

Serbest çalışan hekimlerin sorumluluğu

Tedavi sözleşmesinden doğan sorumluluk ile haksız fiilden kaynaklanan sorumlulukların yansıması durumunda hakim; lehe olanı uygular. Özel hukuk kuraları uygulanır.

Sözleşmeye aykırılık ya da haksız fiil nedeniyle tazminat sorumluluğuyla karşılaşılır.

Kamuda çalışan hekimlerin sorumluluğu

Hastaya karşı direkt hekim değil hastane sorumlu olur. Özel hukuk anlamında bir ilişki yoktur.

Yargıtay Genel Kurul karar ile kamu hastanesinde görev yapan hekimlere karşı doğrudan tazminat davası açılmaz.

TEDAVİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER

Hasta Yükümlülüğü	Hekim Yükümlülüğü;
- Ücret ödeme, - Doğru bilgi verme, - İşbirliği, - Tedavi ile ilgili ve gerekli belgeleri verme, - Hekim tarafından verilecek talimatlara uyma, - Teşhise yönelik incelemelere uyma, - Teşhis ve tedaviye yönelik inceleme ve uygulamalara itaat etme borcu	- Teşhis koyma, - Tedavi yöntemlerini seçme ve uygulama, - Tedaviyi bizzat yapma, - Hastayı aydınlatma, - Hasta rızası (aydınlatılmış onam) - Sadakat ve özen yükümlülüğü, (sır saklama yükümlülüğü de kapsar)

Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü

- Tıbbi tedavi ve müdahalenin hukuka uygunluğu için hastanın tıbbi müdahale hakkında tüm bilgiler verilmiş olmalıdır.
- Hastanın; müdahalenin nasıl yapılacağı ve müdahalenin sonuçları ile, teşhis, tıbbi tedavi ve gerekli tıbbi meseleler hakkında aydınlatılması gerekmektedir.
- Hasta aydınlatılması;
 - Konuların tanınım ayrıntılandırılması,
 - Tanya göre yapılması gereken tedavi yöntemi ve başarı şansının ne olacağı,
 - Ne için bu tedavi yönteminin seçildiği,
 - Ne gibi riskler taşıdığı,
 - Önerilen tedavinin müdahalenin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek sonuçların neler olabileceği,
 - Başka bir tedavi seçeneği olup olmadığı hakkında yapılmalıdır.

md.25'te Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı düzenlenmiştir.

- Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir.
- Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine kullanılmaz.
- Örnek Vaka: **"Bütürlüğü tıbben uygun değilken hastanın habersiz tek eden hasta"**; hasta önceden ayrıntılı aydınlatılmış ise; hastanın kaçtığı ayrıntılı tutanakla tespit edilmiş ve yasal temsilcisi ya da hastanın kendine ulaşmaya çalışılmış ve sonucunda tüm hususun ayrıntılı şekilde kayda alınması neticesinde hekim, hastanenin ya da personelin sorumluluğuna gidilemeyecektir.

Sadakat ve Özen Yükümlülüğü

- Tedavi sözleşmesindeki en önemli yükümlülüktür.
- TBK md.506/2.3'te: Özen borcundan doğan sorumluluğun belirlenmesinde "benzer alanda iş ve hizmetleri üfelenen basiretli bir vakfın" göstermesi gereken davranışın esas alınacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla; hekim de basiretli bir hekimin göstermesi gereken özeni göstermekle yükümlüdür.
- Sadakat borcu; hastanın yararına davranışlarda bulunma yükümlülüğüdür. Tıbbi müdahale yapıldığı anda, öncesinde ve sonrasında da geçerlidir.

Örnek Vaka; "Tümörülü böbreği yerine diğer böbreği çıkarılan hasta"

- Özen yükümlülüğü ihlali söz konusudur.
- Yanlış böbreğin çıkarılması sebep olan tüm ameliyat ekibi ile servis görevlilerin;

- TBK Ceza Kanunu (TCK) 89'dan;** 225, "bir den fazla kişiyi baskı ile tehdit eden suç"ta haksız kısıtlama suçundan dolayı sorumlu tutulur. Her failin cezası kusuruna göre belirlenir."
- Tazminat, 89'dan;** birlikte, zarara sebebiyet verme suçu olduğundan müteselselen sorumlu olacaktırlar.
- TCK 89;** taksirle yaralama suçu oluşturacak;
- Özetle;** "Hekimin reçete ile reçete öğrenci veya sekretere vermesi, önerilen ilaç yerine aynı bandaj başka ilaç verilmesi nedeniyle hasta ölümü halinde; "özen ve dikkat yükümlülüğü ihlali ile taksirle ölüme sebebiyet" TCK 225 ve maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır. Hekim iftisi kendi kullanmakta yükümlüdür."

MALPRAKTİS SORUMLULUĞU

- Tıbbi malpraktis (*malpractice*); tıbbi uygulamalarda bulunan hekim ve yardımcı personelin mesleğin gerektirdiği ortalama dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle yapılan tıbbi hatadır.
- Hasta kabulde,
 - Acilde,
 - Teşhiste,
 - Tedavide malpraktis sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.

Asistanlar; "eğitim gören" konumunda bulunduklarından dolayı uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren tıbbi uygulamaları TEK BAŞLARINA YAPMALARİ UYGUN DEĞİLDİR.

- Her kurum; asistan eğitimlerini; öğretim görevlisi, baş asistan ve uzman sayısına göre planlaması gerekmekte olup; bir öğretim görevlisi, başasistan veya uzman birden fazla asistana nezaret edecek şekilde eğitimler organize edilecektir.
- Asistana nezaret eden ilgili öğretim görevlisi, başasistan ve uzmanın bilgisi ve değerlendirmesi bulunmadan hastalara tedavi planlanmayacaktır. Hastalara yapılan uygulamalar ile planlanan tedavilerden, asistana nezaret eden ilgili öğretim görevlisi, başasistan ve uzmanın sorumlu olduğunun Sağlık Bakanlığı tarafından genelge ile hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

Uzmanlığı gerektiren tıbbi vakaya asistan tarafından bakılması;




KOMPLİKASYON

- Tıbbi yardım ve müdahale sırasında öngörülemeyen bir tehlikenin aniden ve umulmadık bir şekilde ortaya çıkmasıdır. **(dış veri niteliği)**
- Hastada oluşan komplikasyondan kaynaklandığının anlaşılması için;
- Komplikasyonlara karşı tüm önlemlerin alınması, araç gereçlerin bulundurulmuş olması, gerekli müdahalelerin yapılması gerekmektedir.
- Komplikasyonlarda tüm bu önlemler alınmış olması şartıyla; hekimin ya da hastanenin ya da yardımcı personellerin sorumluluğuna gidilemeyecektir.
- Her hastalığa göre değişen durumlar olup; her hastalıkta aynı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK VAKALAR İLE HEKİM SORUMLULUĞU

- I. Örnek Vakalar**
- İlaç listesinin hekim tarafından hastadan yanlış alınması neticesinde kalbinde stent olan hastanın kan sulandığını ilacının kesilmesi neticesinde kalp krizi geçiren hasta;
 - İlaç doz ayarlaması yapılmadığı için karaciğer yetmezliğine giren hasta;
 - Konsültasyon notu okunmadığı için antibiyotik geç verilmiş hastanın ölmesi;
 - Kalp krizi geçirirken muayene edilmeyen, EKG çekilmeyen gastrit tedavisi verilen hasta;
 - Ağızdan verilmesi gereken ilaç için yanlışlıkla damardan verilmesi sonucunda akciğer embolisi gerçekleşen hasta;

Sayılan tüm vakalarda; hekimin uygulama ve özen yükümlülüğüne dair sorumluluğu bulunmaktadır.



Tazminat açısından;

KAMU HASTANESİ	ÖZEL HASTANE
Olayın kamu hastanesinde gerçekleşmesinde; hekime doğrudan değil hastaneye karşı Tam Yargı Davası açılacak. İdare tarafından yükümlülük yerine getirilmeden sonra idare; sorumlu hekimle ilgili davası açarak hekimden zarar karşılanacaktır.	Olay özel hastanede olmuş ise; hastaneye doğrudan dava açılacağı gibi; hekime de doğrudan dava açılabilir. Sözleşmeye dayalı olarak ita yardımcıları tarafından sorumluluk; haksız fiile dayanılırsa haksız fiilden kaynaklanan adam çalıştırmanın sorumluluğuna göre özel hastane de sorumlu tutulacaktır.

II. Örnek Vakalar

- İdrarda mikroskopik hematüresi olup idrar yolu enfeksiyonu denilerek nefrolog hekimlere yönlendirilmeyen hastanın son dönem böbrek yetmezliğine girmesi;
 - Nefroloji bölümünde diyaliz önerilen hastanın diyalize alınmaması ve sonucunda hastada komplikasyonlar gelişmesi.
- Olaylarda birtakım raporları doğrultusunda **iyet tedbir tespit** halinde;
- TCK açısından; taksirli yaralama suçu ve Tazminat sorumluluğu ortaya çıkacaktır.
- Hekimlerin uzmanlık alanı dışındaki vakalarda mutlaka alanında uzman hekimlere danışması ve tedavinin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. Aksi ceza ve hukuki sorumluluk doğurur.

III. Örnek Vakalar

- Vaka;** Nefroloji bölümüne danışmadan; ancak istem kağıdına danışıldı yazılarla diyalize gönderilen hastaya ilişkin;
- Nefroloji Bölümüne bağlı diyalize ilişkin sorumlu uzmanın talimatı olmadan hastayı diyalize alan personelin KUSURU ile özen yükümlülüğünün ihlali; buna bağlı olarak ceza ve hukuki yükümlülükleri yanında;
- İstem kağıdına gerçeğe aykırı kayıt düşmesi nedeniyle ile TCK 204. maddesi gereğince Resmi Belgede Sahtecilik Suçu da işlenmiş olacaktır.

IV. Örnek

Vaka; sisteminde 0 hatası nedeniyle hastaya 10 kat ilaç verilmesi

Doktor

Tarafından

- Özen ve Dikkat Yükümlülüğü nedeniyle hastanın zarara uğramasına bağlı olarak ceza ve tazminat sorumluluğu vardır.
- Hekimin hemşire ve yardımcılarına doğru talimat verme ve denetleme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Hemşire

Tarafından

- Hemşire; hekimin verdiği talimatları uygulamalıdır. ANCAK; Hemşire Yönetmeliğine göre; tıbbi iş ve tedavinin hastaya zarar verdiğini öngördüğü durumlarda hekim ile durumu görüşmesi ve hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talimatı ile işlem yapması gerekir. Doz kullanılabildiği bir doz ise sorumluluk yüklenmez; ancak yanlış işlemler sorumluluk yüklenilecektir.

V. Örnek Vaka;

Gebelik sorgulaması ve testi yapılmadığı için gebelikte kesintile kullanılmayan ilaç başlanan hasta sonucunda;

KÜRTAJ	SAĞLIKLIL BEBEK
Taksirli Yaralama Suçu 89/3; gebe kadının çocuğunun düşmesine neden olma nedeniyle ceza bir katartılır.	Bebekte ilerleyen dönemlerde de buna bağlı sağlık sorunu çıkmaz ise; ceza sorumluluk olmayacaktır.
Maddi ve Manevi Tazminat Sorumluluğu	Doğuma kadar beklenen üzüntü, kaygı, stres için Manevi Tazminat Sorumluluğu

VIII. Örnek

Vakalar

Hem diyaliz seansı sırasında sigara içmek istediği için kendini 15 dakikada bir diyalizden çıkartıp tekrar bağlatmaya çalışan kabul edilmeyince kavga çıkaran hasta ile uyandırılmasına rağmen 13.30'daki diyaliz seansına her defasında 14.30'da gelen hasta

Hasta Hakları Yönetmeliğinde de düzenlenen **"Hastanın işbirliği yükümlülüğü"** bulunmaktadır. Hastanın; başvurduğu kuruluşun kural ve uygulamalarına uygun davranması yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğe aykırılık nedeniyle kurum, personele ve hekime sorumluluk yüklenilemez. Hastanın kusurlu davranışlarının işbirliği amacı ile durumun tutanak ile tespit önem taşıyor. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları; Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne bağlı olarak; tabip ve dış tabibi meslekli veya şahsi sebeplerle tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir. Ancak; diğer meslektaşın tedavi veya müdahalesine imkan verecek zamanı önceden hesaplayarak hastayı vaktinde haberdar etmesi şart olduğu gibi; hastanın bırakılması halinde hayatının tehlikeye düşmesi veya sağlığının zarara uğraması muhtemeldir; diğer meslektaşın temin edilemedikçe terk edilemez.

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE CİNSİYET AYRIMI VARDIR? YOKTUR 13

Original Paper

Predictors of Blood Pressure Response to Angiotensin Receptor Blocker/Diuretic Combination Therapy: A Secondary Analysis of the Irbesartan/Hydrochlorothiazide Blood Pressure Reductions in Diverse Patient Populations (INCLUSIVE) Study

David G. Brodeur, MD, PhD, David G. Brodeur, MD, PhD, David G. Brodeur, MD, PhD

The secondary analysis of the Irbesartan/Hydrochlorothiazide Blood Pressure Reductions in Diverse Patient Populations (INCLUSIVE) study investigated whether baseline demographic and clinical variables are predictive of different degrees of blood pressure reduction following an angiotensin II receptor blocker/diuretic treatment regimen. Irbesartan/hydrochlorothiazide and other angiotensin receptor blocker combinations with a diuretic have been shown to be effective in reducing systolic blood pressure in a diverse patient population previously unrepresented in meta-analyses. Ordinary least squares regression analysis was performed on the available data.


population of the INCLUSIVE study to identify variables predictive of variations in blood pressure changes in response to irbesartan/hydrochlorothiazide combination therapy. **Hypertension, systolic blood pressure, female sex, age, 24-hour, and diastolic blood pressure** were found to be predictive of additional blood pressure lowering with this combination. The impact of higher baseline systolic blood pressure and diastolic blood pressure on changes in systolic blood pressure were diminished in female patients compared with male patients. In conclusion, a significant correlation may exist between certain clinical/demographic characteristics and the extent of the therapeutic response to irbesartan/hydrochlorothiazide treatment. (J Am Board Fam Pract 2015; 28:166-177, 21)

Brief Report

Combination Therapy Versus Monotherapy as Initial Treatment for Stage 2 Hypertension: Results of a Randomized, Open-Label Trial

David G. Brodeur, MD, PhD, David G. Brodeur, MD, PhD, David G. Brodeur, MD, PhD

Evre 2 hipertansif 1668 hasta
% 45.3'ü kadın,
% 23.5 siyah
% 13.2 yaşlı,
% 59.1 obez
% 10 diyabet



Outcomes in subgroups of hypertensive patients treated with regimens based on valsartan and amlodipine: an analysis of findings from the VALUE trial


Methods The 15 245 hypertensive patients participating in VALUE were divided into subgroups according to baseline characteristics. Treatment by subgroup interaction analyses were carried out by a Cox proportional hazard model. Within each subgroup, treatment effects were assessed by hazard ratios and 95% confidence intervals.

Results For cardiac mortality and morbidity, the only significant subgroup by treatment interaction was of sex ($P = 0.016$), with the hazard ratio indicating a relative excess of cardiac events with valsartan treatment in women but not in men, but SBP differences in favour of amlodipine were distinctly greater in women. No other subgroup

Randomize kontrollü çalışmalarda kadınların temsili

✓ Tüm kardiyovasküler çalışmaların sadece % 24'ünde cinsiyetle ilişkili alt grup analizleri mevcut

Randomize çalışmaların % 44'ünde kadınlar temsil ediliyor.



A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control

The SPRINT Research Group*

- Diyabeti olmayan toplam 9361 vaka takipte intensif tedavi alan grup ile standart tedavi alan grup karşılaştırılıyor
- İntensif tedavi alan grubun ortalama SKB 121.4 mm Hg; standart tedavi alan grubun ise 136.2 mm Hg.
- Çalışma 3.26 yılda erken sonlandırılıyor; intensif gruptaki azalmış tüm nedenlere bağlı ölüm oranları yüzünden

N Engl J Med 2015; 373: 22


Table 1. Baseline Characteristics of the Study Populations*

	Intensive Treatment (n=4675)	Standard Treatment (n=4686)
Demographics		
Diabetes (n=1000)	217 (4.6)	210 (4.5)
Age (yr)	57.0 (10.4)	57.0 (10.4)
Female (n=2000)	999 (49.9)	999 (49.9)
Cardiovascular disease		
Coronary	279 (5.9)	280 (5.9)
Stroke	247 (5.3)	246 (5.3)
Peripheral artery disease	154 (3.3)	154 (3.3)
Chronic kidney disease	154 (3.3)	154 (3.3)
Current smoker (n=1000)	217 (4.6)	210 (4.5)

SPRINT: Under Recruitment Of Women



Figure 1. Forest Plot of Primary Outcome According to Subgroups



Efficacy and Tolerance of Antihypertensive Treatment in Men and Women With Stage 1 Diastolic Hypertension

Results of the Treatment of Mild Hypertension Study

Objective To explore the sex-specific benefits and risks of treatment of stage 1 diastolic hypertension.

Methods Participants were African-American and white hypertensive men (n=107) and women (n=107) aged 45 to 64 years with a diastolic blood pressure less than 100 mm Hg. Participants were randomized to treatment with placebo, atenolol (10 mg), atenolol (20 mg), atenolol (30 mg), atenolol (40 mg), atenolol (50 mg), atenolol (60 mg), atenolol (70 mg), atenolol (80 mg), atenolol (90 mg), atenolol (100 mg), atenolol (110 mg), atenolol (120 mg), atenolol (130 mg), atenolol (140 mg), atenolol (150 mg), atenolol (160 mg), atenolol (170 mg), atenolol (180 mg), atenolol (190 mg), atenolol (200 mg), atenolol (210 mg), atenolol (220 mg), atenolol (230 mg), atenolol (240 mg), atenolol (250 mg), atenolol (260 mg), atenolol (270 mg), atenolol (280 mg), atenolol (290 mg), atenolol (300 mg), atenolol (310 mg), atenolol (320 mg), atenolol (330 mg), atenolol (340 mg), atenolol (350 mg), atenolol (360 mg), atenolol (370 mg), atenolol (380 mg), atenolol (390 mg), atenolol (400 mg), atenolol (410 mg), atenolol (420 mg), atenolol (430 mg), atenolol (440 mg), atenolol (450 mg), atenolol (460 mg), atenolol (470 mg), atenolol (480 mg), atenolol (490 mg), atenolol (500 mg), atenolol (510 mg), atenolol (520 mg), atenolol (530 mg), atenolol (540 mg), atenolol (550 mg), atenolol (560 mg), atenolol (570 mg), atenolol (580 mg), atenolol (590 mg), atenolol (600 mg), atenolol (610 mg), atenolol (620 mg), atenolol (630 mg), atenolol (640 mg), atenolol (650 mg), atenolol (660 mg), atenolol (670 mg), atenolol (680 mg), atenolol (690 mg), atenolol (700 mg), atenolol (710 mg), atenolol (720 mg), atenolol (730 mg), atenolol (740 mg), atenolol (750 mg), atenolol (760 mg), atenolol (770 mg), atenolol (780 mg), atenolol (790 mg), atenolol (800 mg), atenolol (810 mg), atenolol (820 mg), atenolol (830 mg), atenolol (840 mg), atenolol (850 mg), atenolol (860 mg), atenolol (870 mg), atenolol (880 mg), atenolol (890 mg), atenolol (900 mg), atenolol (910 mg), atenolol (920 mg), atenolol (930 mg), atenolol (940 mg), atenolol (950 mg), atenolol (960 mg), atenolol (970 mg), atenolol (980 mg), atenolol (990 mg), atenolol (1000 mg), atenolol (1010 mg), atenolol (1020 mg), atenolol (1030 mg), atenolol (1040 mg), atenolol (1050 mg), atenolol (1060 mg), atenolol (1070 mg), atenolol (1080 mg), atenolol (1090 mg), atenolol (1100 mg), atenolol (1110 mg), atenolol (1120 mg), atenolol (1130 mg), atenolol (1140 mg), atenolol (1150 mg), atenolol (1160 mg), atenolol (1170 mg), atenolol (1180 mg), atenolol (1190 mg), atenolol (1200 mg), atenolol (1210 mg), atenolol (1220 mg), atenolol (1230 mg), atenolol (1240 mg), atenolol (1250 mg), atenolol (1260 mg), atenolol (1270 mg), atenolol (1280 mg), atenolol (1290 mg), atenolol (1300 mg), atenolol (1310 mg), atenolol (1320 mg), atenolol (1330 mg), atenolol (1340 mg), atenolol (1350 mg), atenolol (1360 mg), atenolol (1370 mg), atenolol (1380 mg), atenolol (1390 mg), atenolol (1400 mg), atenolol (1410 mg), atenolol (1420 mg), atenolol (1430 mg), atenolol (1440 mg), atenolol (1450 mg), atenolol (1460 mg), atenolol (1470 mg), atenolol (1480 mg), atenolol (1490 mg), atenolol (1500 mg), atenolol (1510 mg), atenolol (1520 mg), atenolol (1530 mg), atenolol (1540 mg), atenolol (1550 mg), atenolol (1560 mg), atenolol (1570 mg), atenolol (1580 mg), atenolol (1590 mg), atenolol (1600 mg), atenolol (1610 mg), atenolol (1620 mg), atenolol (1630 mg), atenolol (1640 mg), atenolol (1650 mg), atenolol (1660 mg), atenolol (1670 mg), atenolol (1680 mg), atenolol (1690 mg), atenolol (1700 mg), atenolol (1710 mg), atenolol (1720 mg), atenolol (1730 mg), atenolol (1740 mg), atenolol (1750 mg), atenolol (1760 mg), atenolol (1770 mg), atenolol (1780 mg), atenolol (1790 mg), atenolol (1800 mg), atenolol (1810 mg), atenolol (1820 mg), atenolol (1830 mg), atenolol (1840 mg), atenolol (1850 mg), atenolol (1860 mg), atenolol (1870 mg), atenolol (1880 mg), atenolol (1890 mg), atenolol (1900 mg), atenolol (1910 mg), atenolol (1920 mg), atenolol (1930 mg), atenolol (1940 mg), atenolol (1950 mg), atenolol (1960 mg), atenolol (1970 mg), atenolol (1980 mg), atenolol (1990 mg), atenolol (2000 mg), atenolol (2010 mg), atenolol (2020 mg), atenolol (2030 mg), atenolol (2040 mg), atenolol (2050 mg), atenolol (2060 mg), atenolol (2070 mg), atenolol (2080 mg), atenolol (2090 mg), atenolol (2100 mg), atenolol (2110 mg), atenolol (2120 mg), atenolol (2130 mg), atenolol (2140 mg), atenolol (2150 mg), atenolol (2160 mg), atenolol (2170 mg), atenolol (2180 mg), atenolol (2190 mg), atenolol (2200 mg), atenolol (2210 mg), atenolol (2220 mg), atenolol (2230 mg), atenolol (2240 mg), atenolol (2250 mg), atenolol (2260 mg), atenolol (2270 mg), atenolol (2280 mg), atenolol (2290 mg), atenolol (2300 mg), atenolol (2310 mg), atenolol (2320 mg), atenolol (2330 mg), atenolol (2340 mg), atenolol (2350 mg), atenolol (2360 mg), atenolol (2370 mg), atenolol (2380 mg), atenolol (2390 mg), atenolol (2400 mg), atenolol (2410 mg), atenolol (2420 mg), atenolol (2430 mg), atenolol (2440 mg), atenolol (2450 mg), atenolol (2460 mg), atenolol (2470 mg), atenolol (2480 mg), atenolol (2490 mg), atenolol (2500 mg), atenolol (2510 mg), atenolol (2520 mg), atenolol (2530 mg), atenolol (2540 mg), atenolol (2550 mg), atenolol (2560 mg), atenolol (2570 mg), atenolol (2580 mg), atenolol (2590 mg), atenolol (2600 mg), atenolol (2610 mg), atenolol (2620 mg), atenolol (2630 mg), atenolol (2640 mg), atenolol (2650 mg), atenolol (2660 mg), atenolol (2670 mg), atenolol (2680 mg), atenolol (2690 mg), atenolol (2700 mg), atenolol (2710 mg), atenolol (2720 mg), atenolol (2730 mg), atenolol (2740 mg), atenolol (2750 mg), atenolol (2760 mg), atenolol (2770 mg), atenolol (2780 mg), atenolol (2790 mg), atenolol (2800 mg), atenolol (2810 mg), atenolol (2820 mg), atenolol (2830 mg), atenolol (2840 mg), atenolol (2850 mg), atenolol (2860 mg), atenolol (2870 mg), atenolol (2880 mg), atenolol (2890 mg), atenolol (2900 mg), atenolol (2910 mg), atenolol (2920 mg), atenolol (2930 mg), atenolol (2940 mg), atenolol (2950 mg), atenolol (2960 mg), atenolol (2970 mg), atenolol (2980 mg), atenolol (2990 mg), atenolol (3000 mg), atenolol (3010 mg), atenolol (3020 mg), atenolol (3030 mg), atenolol (3040 mg), atenolol (3050 mg), atenolol (3060 mg), atenolol (3070 mg), atenolol (3080 mg), atenolol (3090 mg), atenolol (3100 mg), atenolol (3110 mg), atenolol (3120 mg), atenolol (3130 mg), atenolol (3140 mg), atenolol (3150 mg), atenolol (3160 mg), atenolol (3170 mg), atenolol (3180 mg), atenolol (3190 mg), atenolol (3200 mg), atenolol (3210 mg), atenolol (3220 mg), atenolol (3230 mg), atenolol (3240 mg), atenolol (3250 mg), atenolol (3260 mg), atenolol (3270 mg), atenolol (3280 mg), atenolol (3290 mg), atenolol (3300 mg), atenolol (3310 mg), atenolol (3320 mg), atenolol (3330 mg), atenolol (3340 mg), atenolol (3350 mg), atenolol (3360 mg), atenolol (3370 mg), atenolol (3380 mg), atenolol (3390 mg), atenolol (3400 mg), atenolol (3410 mg), atenolol (3420 mg), atenolol (3430 mg), atenolol (3440 mg), atenolol (3450 mg), atenolol (3460 mg), atenolol (3470 mg), atenolol (3480 mg), atenolol (3490 mg), atenolol (3500 mg), atenolol (3510 mg), atenolol (3520 mg), atenolol (3530 mg), atenolol (3540 mg), atenolol (3550 mg), atenolol (3560 mg), atenolol (3570 mg), atenolol (3580 mg), atenolol (3590 mg), atenolol (3600 mg), atenolol (3610 mg), atenolol (3620 mg), atenolol (3630 mg), atenolol (3640 mg), atenolol (3650 mg), atenolol (3660 mg), atenolol (3670 mg), atenolol (3680 mg), atenolol (3690 mg), atenolol (3700 mg), atenolol (3710 mg), atenolol (3720 mg), atenolol (3730 mg), atenolol (3740 mg), atenolol (3750 mg), atenolol (3760 mg), atenolol (3770 mg), atenolol (3780 mg), atenolol (3790 mg), atenolol (3800 mg), atenolol (3810 mg), atenolol (3820 mg), atenolol (3830 mg), atenolol (3840 mg), atenolol (3850 mg), atenolol (3860 mg), atenolol (3870 mg), atenolol (3880 mg), atenolol (3890 mg), atenolol (3900 mg), atenolol (3910 mg), atenolol (3920 mg), atenolol (3930 mg), atenolol (3940 mg), atenolol (3950 mg), atenolol (3960 mg), atenolol (3970 mg), atenolol (3980 mg), atenolol (3990 mg), atenolol (4000 mg), atenolol (4010 mg), atenolol (4020 mg), atenolol (4030 mg), atenolol (4040 mg), atenolol (4050 mg), atenolol (4060 mg), atenolol (4070 mg), atenolol (4080 mg), atenolol (4090 mg), atenolol (4100 mg), atenolol (4110 mg), atenolol (4120 mg), atenolol (4130 mg), atenolol (4140 mg), atenolol (4150 mg), atenolol (4160 mg), atenolol (4170 mg), atenolol (4180 mg), atenolol (4190 mg), atenolol (4200 mg), atenolol (4210 mg), atenolol (4220 mg), atenolol (4230 mg), atenolol (4240 mg), atenolol (4250 mg), atenolol (4260 mg), atenolol (4270 mg), atenolol (4280 mg), atenolol (4290 mg), atenolol (4300 mg), atenolol (4310 mg), atenolol (4320 mg), atenolol (4330 mg), atenolol (4340 mg), atenolol (4350 mg), atenolol (4360 mg), atenolol (4370 mg), atenolol (4380 mg), atenolol (4390 mg), atenolol (4400 mg), atenolol (4410 mg), atenolol (4420 mg), atenolol (4430 mg), atenolol (4440 mg), atenolol (4450 mg), atenolol (4460 mg), atenolol (4470 mg), atenolol (4480 mg), atenolol (4490 mg), atenolol (4500 mg), atenolol (4510 mg), atenolol (4520 mg), atenolol (4530 mg), atenolol (4540 mg), atenolol (4550 mg), atenolol (4560 mg), atenolol (4570 mg), atenolol (4580 mg), atenolol (4590 mg), atenolol (4600 mg), atenolol (4610 mg), atenolol (4620 mg), atenolol (4630 mg), atenolol (4640 mg), atenolol (4650 mg), atenolol (4660 mg), atenolol (4670 mg), atenolol (4680 mg), atenolol (4690 mg), atenolol (4700 mg), atenolol (4710 mg), atenolol (4720 mg), atenolol (4730 mg), atenolol (4740 mg), atenolol (4750 mg), atenolol (4760 mg), atenolol (4770 mg), atenolol (4780 mg), atenolol (4790 mg), atenolol (4800 mg), atenolol (4810 mg), atenolol (4820 mg), atenolol (4830 mg), atenolol (4840 mg), atenolol (4850 mg), atenolol (4860 mg), atenolol (4870 mg), atenolol (4880 mg), atenolol (4890 mg), atenolol (4900 mg), atenolol (4910 mg), atenolol (4920 mg), atenolol (4930 mg), atenolol (4940 mg), atenolol (4950 mg), atenolol (4960 mg), atenolol (4970 mg), atenolol (4980 mg), atenolol (4990 mg), atenolol (5000 mg), atenolol (5010 mg), atenolol (5020 mg), atenolol (5030 mg), atenolol (5040 mg), atenolol (5050 mg), atenolol (5060 mg), atenolol (5070 mg), atenolol (5080 mg), atenolol (5090 mg), atenolol (5100 mg), atenolol (5110 mg), atenolol (5120 mg), atenolol (5130 mg), atenolol (5140 mg), atenolol (5150 mg), atenolol (5160 mg), atenolol (5170 mg), atenolol (5180 mg), atenolol (5190 mg), atenolol (5200 mg), atenolol (5210 mg), atenolol (5220 mg), atenolol (5230 mg), atenolol (5240 mg), atenolol (5250 mg), atenolol (5260 mg), atenolol (5270 mg), atenolol (5280 mg), atenolol (5290 mg), atenolol (5300 mg), atenolol (5310 mg), atenolol (5320 mg), atenolol (5330 mg), atenolol (5340 mg), atenolol (5350 mg), atenolol (5360 mg), atenolol (5370 mg), atenolol (5380 mg), atenolol (5390 mg), atenolol (5400 mg), atenolol (5410 mg), atenolol (5420 mg), atenolol (5430 mg), atenolol (5440 mg), atenolol (5450 mg), atenolol (5460 mg), atenolol (5470 mg), atenolol (5480 mg), atenolol (5490 mg), atenolol (5500 mg), atenolol (5510 mg), atenolol (5520 mg), atenolol (5530 mg), atenolol (5540 mg), atenolol (5550 mg), atenolol (5560 mg), atenolol (5570 mg), atenolol (5580 mg), atenolol (5590 mg), atenolol (5600 mg), atenolol (5610 mg), atenolol (5620 mg), atenolol (5630 mg), atenolol (5640 mg), atenolol (5650 mg), atenolol (5660 mg), atenolol (5670 mg), atenolol (5680 mg), atenolol (5690 mg), atenolol (5700 mg), atenolol (5710 mg), atenolol (5720 mg), atenolol (5730 mg), atenolol (5740 mg), atenolol (5750 mg), atenolol (5760 mg), atenolol (5770 mg), atenolol (5780 mg), atenolol (5790 mg), atenolol (5800 mg), atenolol (5810 mg), atenolol (5820 mg), atenolol (5830 mg), atenolol (5840 mg), atenolol (5850 mg), atenolol (5860 mg), atenolol (5870 mg), atenolol (5880 mg), atenolol (5890 mg), atenolol (5900 mg), atenolol (5910 mg), atenolol (5920 mg), atenolol (5930 mg), atenolol (5940 mg), atenolol (5950 mg), atenolol (5960 mg), atenolol (5970 mg), atenolol (5980 mg), atenolol (5990 mg), atenolol (6000 mg), atenolol (6010 mg), atenolol (6020 mg), atenolol (6030 mg), atenolol (6040 mg), atenolol (6050 mg), atenolol (6060 mg), atenolol (6070 mg), atenolol (6080 mg), atenolol (6090 mg), atenolol (6100 mg), atenolol (6110 mg), atenolol (6120 mg), atenolol (6130 mg), atenolol (6140 mg), atenolol (6150 mg), atenolol (6160 mg), atenolol (6170 mg), atenolol (6180 mg), atenolol (6190 mg), atenolol (6200 mg), atenolol (6210 mg), atenolol (6220 mg), atenolol (6230 mg), atenolol (6240 mg), atenolol (6250 mg), atenolol (6260 mg), atenolol (6270 mg), atenolol (6280 mg), atenolol (6290 mg), atenolol (6300 mg), atenolol (6310 mg), atenolol (6320 mg), atenolol (6330 mg), atenolol (6340 mg), atenolol (6350 mg), atenolol (6360 mg), atenolol (6370 mg), atenolol (6380 mg), atenolol (6390 mg), atenolol (6400 mg), atenolol (6410 mg), atenolol (6420 mg), atenolol (6430 mg), atenolol (6440 mg), atenolol (6450 mg), atenolol (6460 mg), atenolol (6470 mg), atenolol (6480 mg), atenolol (6490 mg), atenolol (6500 mg), atenolol (6510 mg), atenolol (6520 mg), atenolol (6530 mg), atenolol (6540 mg), atenolol (6550 mg), atenolol (6560 mg), atenolol (6570 mg), atenolol (6580 mg), atenolol (6590 mg), atenolol (6600 mg), atenolol (6610 mg), atenolol (6620 mg), atenolol (6630 mg), atenolol (6640 mg), atenolol (6650 mg), atenolol (6660 mg), atenolol (6670 mg), atenolol (6680 mg), atenolol (6690 mg), atenolol (6700 mg), atenolol (6710 mg), atenolol (6720 mg), atenolol (6730 mg), atenolol (6740 mg), atenolol (6750 mg), atenolol (6760 mg), atenolol (6770 mg), atenolol (6780 mg), atenolol (6790 mg), atenolol (6800 mg), atenolol (6810 mg), atenolol (6820 mg), atenolol (6830 mg), atenolol (6840 mg), atenolol (6850 mg), atenolol (6860 mg), atenolol (6870 mg), atenolol (6880 mg), atenolol (6890 mg), atenolol (6900 mg), atenolol (6910 mg), atenolol (6920 mg), atenolol (6930 mg), atenolol (6940 mg), atenolol (6950 mg), atenolol (6960 mg), atenolol (6970 mg), atenolol (6980 mg), atenolol (6990 mg), atenolol (7000 mg), atenolol (7010 mg), atenolol (7020 mg), atenolol (7030 mg), atenolol (7040 mg), atenolol (7050 mg), atenolol (7060 mg), atenolol (7070 mg), atenolol (7080 mg), atenolol (7090 mg), atenolol (7100 mg), atenolol (7110 mg), atenolol (7120 mg), atenolol (7130 mg), atenolol (7140 mg), atenolol (7150 mg), atenolol (7160 mg), atenolol (7170 mg), atenolol (7180 mg), atenolol (7190 mg), atenolol (7200 mg), atenolol (7210 mg), atenolol (7220 mg), atenolol (7230 mg), atenolol (7240 mg), atenolol (7250 mg), atenolol (7260 mg), atenolol (7270 mg), atenolol (7280 mg), atenolol (7290 mg), atenolol (7300 mg), atenolol (7310 mg), atenolol (7320 mg), atenolol (7330 mg), atenolol (7340 mg), atenolol (7350 mg), atenolol (7360 mg), atenolol (7370 mg), atenolol (7380 mg), atenolol (7390 mg), atenolol (7400 mg), atenolol (7410 mg), atenolol (7420 mg), atenolol (7430 mg), atenolol (7440 mg), atenolol (7450 mg), atenolol (7460 mg), atenolol (7470 mg), atenolol (7480 mg), atenolol (7490 mg), atenolol (7500 mg), atenolol (7510 mg), atenolol (7520 mg), atenolol (7530 mg), atenolol (7540 mg), atenolol (7550 mg), atenolol (7560 mg), atenolol (7570 mg), atenolol (7580 mg), atenolol (7590 mg), atenolol (7600 mg), atenolol (7610 mg), atenolol (7620 mg), atenolol (7630 mg), atenolol (7640 mg), atenolol (7650 mg), atenolol (7660 mg), atenolol (7670 mg), atenolol (7680 mg), atenolol (7690 mg), atenolol (7700 mg), atenolol (7710 mg), atenolol (7720 mg), atenolol (7730 mg), atenolol (7740 mg), atenolol (7750 mg), atenolol (7760 mg), atenolol (7770 mg), atenolol (7780 mg), atenolol (7790 mg), atenolol (7800 mg), atenolol (7810 mg), atenolol (7820 mg), atenolol (7830 mg), atenolol (7840 mg), atenolol (7850 mg), atenolol (7860 mg), atenolol (7870 mg), atenolol (7880 mg), atenolol (7890 mg), atenolol (7900 mg), atenolol (7910 mg), atenolol (7920 mg), atenolol (7930 mg), atenolol (7940 mg), atenolol (7950 mg), atenolol (7960 mg), atenolol (7970 mg), atenolol (7980 mg), atenolol (7990 mg), atenolol (8000 mg), atenolol (8010 mg), atenolol (8020 mg), atenolol (8030 mg), atenolol (8040 mg), atenolol (8050 mg), atenolol (8060 mg), atenolol (8070 mg), atenolol (8080 mg), atenolol (8090 mg), atenolol (8100 mg), atenolol (8110 mg), atenolol (8120 mg), atenolol (8130 mg), atenolol (8140 mg), atenolol (8150 mg), atenolol (8160 mg), atenolol (8170 mg), atenolol (8180 mg), atenolol (8190 mg), atenolol (8200 mg), atenolol (8210 mg), atenolol (8220 mg), atenolol (8230 mg), atenolol (8240 mg), atenolol (8250 mg), atenolol (8260 mg), atenolol (8270 mg), atenolol (8280 mg), atenolol (8290 mg), atenolol (8300 mg), atenolol (8310 mg), atenolol (8320 mg), atenolol (8330 mg), atenolol (8340 mg), atenolol (8350 mg), atenolol (8360 mg), atenolol (8370 mg), atenolol (8380 mg), atenolol (8390 mg), atenolol (8400 mg), atenolol (8410 mg), atenolol (8420 mg), atenolol (8430 mg), atenolol (8440 mg), atenolol (8450 mg), atenolol (8460 mg), atenolol (8470 mg), atenolol (8480 mg), atenolol (8490 mg), atenolol (8500 mg), atenolol (8510 mg), atenolol (8520 mg), atenolol (8530 mg), atenolol (8540 mg), atenolol (8550 mg), atenolol (8560 mg), atenolol (8570 mg), atenolol (8580 mg), atenolol (8590 mg), atenolol (8600 mg), atenolol (8610 mg), atenolol (8620 mg), atenolol (8630 mg), atenolol (8640 mg), atenolol (8650 mg), atenolol (8660 mg), atenolol (8670 mg), atenolol (8680 mg), atenolol (8690 mg), atenolol (8700 mg), atenolol (8710 mg), atenolol (8720 mg), atenolol (8730 mg), atenolol (8740 mg), atenolol (8750 mg), atenolol (8760 mg), atenolol (8770 mg), atenolol (8780 mg), atenolol (8790 mg), atenolol (8800 mg), atenolol (8810 mg), atenolol (8820 mg), atenolol (8830 mg), atenolol (8840 mg), atenolol (8850 mg), atenolol (8860 mg), atenolol (8870 mg), atenolol (8880 mg), atenolol (8890 mg), atenolol (8900 mg), atenolol (8910 mg), atenolol (8920 mg), atenolol (8930 mg), atenolol (8940 mg), atenolol (8950 mg), atenolol (8960 mg), atenolol (8970 mg), atenolol (8980 mg), atenolol (8990 mg), atenolol (9000 mg), atenolol (9010 mg), atenolol (9020 mg), atenolol (9030 mg), atenolol (9040 mg), atenolol (9050 mg), atenolol (9060 mg), atenolol (9070 mg), atenolol (9080 mg), atenolol (9090 mg), atenolol (9100 mg), atenolol (9110 mg), atenolol (9120 mg), atenolol (9130 mg), atenolol (9140 mg), atenolol (9150 mg), atenolol (9160 mg), atenolol (9170 mg), atenolol (9180 mg), atenolol (9190 mg), atenolol (9200 mg), atenolol (9210 mg), atenolol (9220 mg), atenolol (9230 mg), atenolol (9240 mg), atenolol (9250 mg), atenolol (9260 mg), atenolol (9270 mg), atenolol (9280 mg), atenolol (9290 mg), atenolol (9300 mg), atenolol (9310 mg), atenolol (9320 mg), atenolol (9330 mg), atenolol (9340 mg), atenolol (9350 mg), atenolol (9360 mg), atenolol (9370 mg), atenolol (9380 mg), atenolol (9390 mg), atenolol (9400 mg), atenolol (9410 mg), atenolol (9420 mg), atenolol (9430 mg), atenolol (9440 mg), atenolol (9450 mg), atenolol (9460 mg), atenolol (9470 mg), atenolol (9480 mg), atenolol (9490 mg), atenolol (9500 mg), atenolol (9510 mg), atenolol (9520 mg), atenolol (9530 mg), atenolol (9540 mg), atenolol (9550 mg), atenolol (9560 mg), atenolol (9570 mg), atenolol (9580 mg), atenolol (9590 mg), atenolol (9600 mg), atenolol (9610 mg), atenolol (9620 mg), atenolol (9630 mg), atenolol (9640 mg), atenolol (9650 mg), atenolol (9660 mg), atenolol (9670 mg), atenolol (9680 mg), atenolol (9690 mg), atenolol (9700 mg), atenolol (9710 mg), atenolol (9720 mg), atenolol (9730 mg), atenolol (9740 mg), atenolol (9750 mg), atenolol (9760 mg), atenolol (9770 mg), atenolol (9780 mg), atenolol (9790 mg), atenolol (9800 mg), atenolol (9810 mg), atenolol (9820 mg), atenolol (9830 mg), atenolol (9840 mg), atenolol (9850 mg), atenolol (9860 mg), atenolol (9870 mg), atenolol (9880 mg), atenolol (9890 mg), atenolol (9900 mg), atenolol (9910 mg), atenolol (9920 mg), atenolol (9930 mg), atenolol (9940 mg), atenolol (9950 mg), atenolol (9960 mg), atenolol (9970 mg), atenolol (9980 mg), atenolol (9990 mg), atenolol (10000 mg), atenolol (10010 mg), atenolol (10020 mg), atenolol (10030 mg), atenolol (10040 mg), atenolol (10050 mg), atenolol (10060 mg), atenolol (10070 mg), atenolol (10080 mg), atenolol (10090 mg), atenolol (10100 mg), atenolol (10110 mg), atenolol (10120 mg), atenolol (10130 mg), atenolol (10140 mg), atenolol (10150 mg), atenolol (10160 mg), atenolol (10170 mg), atenolol (10180 mg), atenolol (10190 mg



1 Mayıs - 1 Eylül 2018 tarihleri arasında 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi olmuştur.

9 Mayıs 2018 tarihli Açılış Oturumu'nda Dr. Serpil Müge Değer, Dr. Ülver Derici tarafından Hipertansiyonun Dünü Bugünü ve Yarını hakkında bilgi verilmiştir.

SÖZLÜ BİLDİRİLER I: Renal transplantasyon, Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında Kan Manganez Seviyesi ile Beyin MRI Bulgularının İlişkisi, Böbrek Nakil Hastalarının Akciğer Fonksiyonlarında İyileşme: Ön Çalışma, Böbrek Nakli Hastalarında Osteoporoz ve Serum Sklerostin Düzeyleri, Kronik böbrek yetmezlikli veya Böbrek nakilli hastalarda serum sklerostin düzeyi ile karotis intima-media plak ve kalınlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Böbrek Nakilli Hastalarda Ürik Asit Yüksekliği ve Hiperglisemi Rejeksiyon Gelişimi İçin Risk Faktörleridir. Tek Merkez Deneyimi, Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda Takrolimus ve Siklosporin ile Gözlenen İlaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi.

10 Mayıs 2018: KONFERANS: Hipertansiyon Arenası Yeniden Hareketlendi: Neden yeni bir kılavuza ihtiyaç duyuldu?

Yeni kılavuz ile ne kazandık? Türkiye hipertansiyon profili nasıl Etkilendi?

POSTER TARTIŞMASI bölümü iki salonda yapılmıştır. Salon A'da Diyabet ve Hipertansiyon konusu ele alınmış, Türkiye'de diyabet profili, Diyabetik yaşlı hasta: Hedef kan basıncı? Düşürmek her zaman iyi midir?, Diyabetiklerde maskeli hipertansiyon konuları görülmüştür.

Salon B'de ise; Sık rastlanan ve Unutulmaması Gereken Bulgu: Albuminüri: Türkiye'de Albuminüri Prevalansı: PAİT Araştırması Sonuçları, Mikroalbuminüri Tedavisi : Nasıl Yapılır? konuları ele alınmıştır.

UYDU SEMPOZYUMU: Dünden Bugüne Hipertansiyon Tedavisi, Yeni Antidiyabetikler Kan Basıncını Etkiler mi?

KONFERANS: DOZ SAVAŞLARI: Düşük Doz Salisilat Yüksek Doz Salisilat Karşı

UYDU SEMPOZYUMU: "Kanaate Karşı Kanıtlar" Hipertansiyon Tedavisinde Güncellemeler, Hipertansiyon Tedavisinde Cinsiyet Ayrımı Var mıdır? Vardır, Yoktur.

BİTMEYEN SENFONİ: Kemik Mineral Bozuklukları, Hangisi Daha Kötü? Fosfor, Parathormon, Ne zaman, nasıl tedavi edelim? Olgularla.

SEMPZYUM: Obez Hipertansif Hastaları Nasıl Tedavi Edelim?, Obezite ve hipertansiyon ilişkisi, Medikal Tedavi: Ne zaman, Nereye Kadar?, Bariatrik cerrahi ve kan basıncı.

PANEL: Nefrolojide Malpraktis: Hekimin hukuki sorumluluğu- vakalarla anlatım.

SÖZLÜ BİLDİRİLER II: Böbrek nakilli hastalarda serum endocan düzeyi hipertansiyon ve böbrek fonksiyonlarının kaybı ile ilişkili midir?, Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda inflamatuvar biyobelirteçlerle birlikte oksidatif stresin ve ilgili enzim polimorfizmlerinin değerlendirilmesi, Böbrek Nakli



Olan Çocuklarda Fırsatçı Parazit Enfeksiyonları, HCV pozitif Diyaliz Hastalarında Yeni Tedaviler ve Sonuçları, Kocaeli ilinde hemodiyaliz hastalarındaki pnömokok aşılama farkındalığı, Son Dönem Böbrek Hastalığında Vücut Sıvı Kompozisyonu ile Ekokardiyografik Doku Doppler Ölçümleri Arasındaki İlişki konuları tartışılmıştır.

11 Mayıs 2018: **SEMPZYUM:** Nasıl Yapalım? Kan basıncını nasıl ölçelim ve izleyelim?, Ayaktan kan basıncı ölçüm cihazı raporlarını nasıl yorumlayalım?, Dirençli hipertansiyonu nasıl değerlendirelim?, Kronik Böbrek Hastalığında Kardiyovasküler Cerrahi, Cerrahi öncesi hazırlık ve antihipertansif tedavi yönetimi, Post-op Takip: Ne zaman diyalize alalım?, Post- op RRT Seçimi: Hangisi en doğru? Hemodiyaliz, sürekli tedaviler. Kronik Böbrek Hastalığının Yavaşlatılmasında Hangisi Daha Etkili? ACE inhibitörü daha etkili, ARB daha etkili. Diğer salonda ise "Blue Zone", Taş Devri, Tansiyon konusu ele alınmıştır.

UYDU SEMPOZYUMU: Ürik Asit Dost mu Düşman mı?, Hipertansif Hastada Atriyal Fibrilasyon, Her Diyaliz Mutlu Sonla mı Biter?

SEMPZYUM: Tek Sebep: Üç Farklı Sonuç, Hipertansif böbrek hastalığı, Hipertansif kalp hastalığı, Hipertansif Serebrovasküler olay.

SÖZLÜ BİLDİRİLER III: Böbrek Biyopsisini Kim Yapmalı? Nefrolog mu? Radyolog mu?, IgA nefropatili hastalarda shear wave elastografi yöntemi ile tubuler fibrozis derecesinin belirlenmesi, Büyük soliter basit böbrek kisti serum renalez ve anjiotensinojen seviyeleri üzerine etkili midir?, Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Hastalarında Artmış Toplam Böbrek Hacmi ile Renal ve Kardiyovasküler Olayların İlişkisi, Omega-3 desteğinin diyabetik kronik böbrek hastalarında glisemik kontrol ve böbrek fonksiyonları üzerine etkisinin incelenmesi, Nefroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastaneye Yatış Prokalsitonin Düzeyi Mortalitenin Belirleyicisidir, Geriatrik hastalarda glomerüler filtrasyon hızı(GFH) ile kırıl-ganlık arasındaki ilişki, Acil koroner anjiyografi uygulanan hastalarda kontrast madde nefropatisi gelişme insidansı ve klinik sonuçları ele alınmış olup tartışılmıştır.

UYDU SEMPOZYUMU: Tuzlu mu, tuzsuz mu? konusu da işlenmiştir.

12 Mayıs 2018: **SEMPZYUM:** Gebelik ve Böbrek Kronik böbrek hastası gebe kalmak istiyor, Böbrek nakli hastası gebe kalmak istiyor.

SEMPZYUM: Renal Transplantasyon Sonrası Sorular ve Çözüm Önerileri, Diyabet, Hipertansiyon, Hiperlipidemi.

KONFERANS: RAS Blokajında Önemli Bir Engel Hipertansiyon ve Tedavisi,

Diyalizde Anemi Tedavisi: Demir İle Eritropoetin Eş Değer mi?

UYDU SEMPOZYUMU: Birlikte Gidilecek Daha Çok Yolumuz Var.

SEMPZYUM: Tavuk mu ? Yumurta mı? Hiperürisemi, hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığı, Hiperürisemi: Eski düşmana yeni tedaviler ve getirdikleri.

SÖZLÜ BİLDİRİLER IV: KBH hastalarında acil koroner anjiyografi sonrasında kontrast madde nefropatisi gelişimi ile ilişkili faktörler, Dirençli ailesel akdeniz ateşinde anti IL-1 tedavilerinin etkinliği ve güvenliği, Ağır proteinüri olan veya olmayan hastalarda biyopsi ile kanıtlanmış böbrek hastalıklarının klinikopatolojik özellikleri: Tek merkez deneyimi, Radyokontrast nefrotoksitesi dexpantenol ile önlenir mi?, IgA Nefropatisinde Prognostik Belirteçler: Renal Biyopsi Verilerinin Önemi, Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş olan kalp yetmezliği hastalarında serum VEGF ve sVEGFR-1 seviyeleri.

UYDU SEMPOZYUMU: "NOPOTasyum, No Problem-Kronik Böbrek Hastalığında Hiperpotasemi Tedavisi".

KONFERANS: Eski Hastalıklar, Yeni Tedaviler: Glomerulonefritlerde steroid dışı tedaviler, Ailevi akdeniz ateşi hastalığında kolşisin dışı tedaviler. Diğer salonda ise Sözlü Bildiriler takip etmiştir.

SÖZLÜ BİLDİRİLER V: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Süksinat seviyelerinin Rolü, Hipoksi-Tesvik edici Faktör-1 alfa ve IL-1β Genlerinin Ekspresyonu ile olan ilişkisi.

Deneyisel sklerozan enkapsüle peritonit modelinde adalimumab tedavisinin etkinliği.


Yaşlı hastalarda dolaşan mikropartiküllerin hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık belirteçleri ile olan ilişkisi, Yeni tanı hipertansif hastalarda serum endocan düzeylerinin ateroskleroz ve inflamasyonla ilişkisi.

Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Tutulumu İçin Elde Edilen Artmış Karotid – Femoral Nabız Dalga Hızı ve Ana Karotid Arter Intima-media Kalınlığının İlişkisi.

Yeni tanı hipertansif hastalarda dipper, non-dipper hipertansiyonunun ürik asit düzeyi ve klerensi ile ilişkisi.

Kongrenin 20 Yıllık Hikayesi konusunu Ödül Töreni takip etmiştir.

13 Mayıs 2018'de ise 20. KONGREDEN AKILDA KALANLAR (İTERAKTİF OTURUM), AKILCI İLAÇ OTURUMU: Nefrolojide Akılcı İlaç Kullanımı oturumları yapılmıştır.



KONGRE GAZETELERİ



**35. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon,
Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,
3-7 Ekim 2018, Antalya, Kongre İçinde
Düzenlenecek Kurslar:**

- Olgularla Güncel Nefroloji Kursu,
- İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu,
- Hemodiyaliz Okulu,
- İleri Evre ve Diyalize Giren Kronik Böbrek Hastalarında Diyabet Yönetimi Kursu.

Türk Nefroloji Derneğimizin
olağanüstü çalışmalarını
kutlamaktan büyük onur
duyuyoruz.

Renaliz

1 Eylül 2018'den Sonra Yapılacak Kongre ve Toplantılar

1. 27th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, October 10-15, 2018, Beijing – China.
2. 18th International Conference on Nephrology and Therapeutics, October 22-23, 2018, Osaka- Japan. 8. American Society of Nephrology Kidney Week 2018, October 23-28, 2018, San Diego, CA, USA.
3. 35. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya.
4. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Demeği XII. Kongresi, Transplantasyon '18, 18-21 Ekim 2018 / Trabzon
5. 1st International Transplant Network kongresi 17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Rixos Sungate Otel, Kemer, Antalya'da gerçekleştirilecektir.
6. Türk Nefroloji Demeği Transplantasyon Yoğun Eğitim Programı, 19-23 Kasım 2018, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi , İbni Sina Hastanesi.
7. 18th IFKF Meeting and 1st Biennial Meeting, 10-12 December 2018, Hotel Savera, Chennai, India.

ANADOLU BÖBREK VAKFI

Erzurum (1980 - 1985)

Ankara (1995 - 2018)

Atatürk Üniversitesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı



Anadolu Böbrek Vakfı, 16 Temmuz 2001 tarihinde; Diyaliz merkezi, doku tiplendirme laboratuvarı, böbrek hastalıkları ve hipertansiyon polikliniğinden oluşan mal varlığını yapılan bir törenle Atatürk Üniversitesi'ne bağışlamıştır. Ayrıca diyaliz merkezinin Prof. Dr. Ayla SAN tarafından kurulduğunu ve Anadolu Böbrek Vakfı'nın yaptığı bağışı gösteren bir levha asılmıştır.

Anadolu Böbrek Vakfı
Sağlık, Eğitim, Araştırma Merkezi



Prof. Dr. Alp İkizler, “Vanderbilt Üniversitesi Nefroloji ve Hipertansiyon Departmanı” Başkanı Oldu



Türk Nefroloji Derneği üyesi meslektaşımız Prof. Dr. T.Alp İkizler, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji ve Hipertansiyon Bölümü Başkanı oluyor.

Uzun süredir Vanderbilt Üniversitesinde çalışan ve dünya çapında tanınan dernek üyemiz Dr. İkizler, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren bu göreve başladı.

Konuyla ilgili haberi okumak için:

<http://news.vumc.org/2018/06/28/ikizler-to-succeed-harris-as-nephrology-and-hypertension-director/>

Dr. İkizler’i kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.



Prof. Alp İKİZLER

Vanderbilt University, Medical Center Catherine McLaughlin-HakimChair in VascularBiology Nashville, TN, ABD
alp.ikizler@vanderbilt.edu

Araştırma Alanları: Akut ve Kronik Böbrek rahatsızlıkları
Beslenme bozuklukları Metabolizma



Prof. Dr. Alp İKİZLER’in Kısa Hayat Hikayesi

Prof. Alp İkizler, 1987 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup İç hastalıkları uzmanlığını 1993 yılında Şişli Etfal Hastanesi’nden, Böbrek hastalıkları (Nefroloji) uzmanlığını 1996 yılında Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden almıştır.

1996 yılından beri Vanderbilt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Prof. İkizler, şu anda İç Hastalıkları Profesörü olup aynı zamanda CatherineMcLaughlinHakim kürsüsü sahibidir.

T. Alp İkizler şu anda Nashville, Tennessee Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi Vasküler Biyoloji ve Tıp Profesörü Catherine McLaughlin Hakim Başkanıdır.

Nefroloji Bölümü Direktör Yardımcısıdır ve aynı zamanda Vanderbilt Üniversitesi Klinik Tercüme Araştırmaları için en önemli eğitim platformları olan Klinik Araştırma Programında Yüksek Lisans derecesini yönetmektedir. Uluslararası Renal Beslenme ve Metabolizma Derneği Başkanıdır.

İkizler Tıp Fakültesini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, stajını ve iç hastalıkları uzmanlığını tamamladıktan sonra aldı. Araştırma grubu, böbrek hastalığı olan hastalarda ciddi klinik sonuçlara yol açan faktörleri araştırmayı amaçlamakta olup, bu nüfus ciddi bir şekilde hastaneye yatma ve ölüm riskini artırmaktadır.

İkizler Laboratuvarının birincil araştırma ilgisi, enflamasyon ve oksidatif strese özel bir ilgi ile böbrek hastalığının beslenme ve metabolik yönleridir. Grubu ayrıca, antioksidan ve antiinflamatuvar tedavilerin, KBH hastalarında oksidatif stres, inflamasyon ve endotele bağlı vasküler fonksiyon üzerindeki etkilerini test eden çalışmalar yürütmektedir.

Akut böbrek hasarı (AKI) da birincil araştırma ilgi alanlarından biridir. İkizler’in ilk çalışmaları, AKI hastalarındaki diyaliz tedavisinin miktarını araştırdı. Son 10 yılda, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi, Dr. İkizler’in yerel liderliğinde AKI hastalarında yapılan geniş klinik çalışmaların bir parçası olmuştur. Bu çalışmalardan biri (PICARD) 5 kurumda gerçekleştirildi ve YBÜ’de yerleşmiş AKI ile birlikte 618 kişiyi içeriyordu, 398 böbrek replasman tedavisi gerektiriyordu ve benzer hasta kohortlarının en kapsamlı fenotipini içeriyordu.

VALID çalışmasının kullanılabilirliği sayesinde, ICU ayarlarında biyolojik belirteç onaylama



konusundaki ilgilerini artırdılar. Dr. İkizler araştırma grubu, AKI’lı hastalara sağlık hizmeti sunumunu geliştirmek için elektronik tıbbi kayıt tabanlı risk sınıflandırma modelleri ve AKI önleme stratejileri geliştirmek için VUMC Biyomedikal Bilişim fakültesi ile işbirliği yapmaktadır. Bu aktiviteler, başlangıçtan beri ASSESS-AKI’ya klinik bir alan olarak katılmalarını sağlamıştır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 243 yayını bulunmaktadır. Birçok kitap bölümüne de katkısı vardır.

Öne Çıkan Yayınları:

1. Impaired Glucose and Insulin Homeostasis in Moderate-Severe CKD.

de Boer IH, Zelnick L, Afkarian M, Ayers E, Curtin L, Himmelfarb J, Ikizler TA, Kahn SE, Kestenbaum B, Utzschneider K (2016) J Am Soc Nephrol 27(9): 2861-71

2. A prospective, Multi-Centre, observational study to examine kidney disease progression in adults with chronic kidney disease - CKDOD - Study design and preliminary results.

Shah B, Kirpalani A, Sunder S, Gupta A, Khanna U, Chafekar D, Tan LP, Sirivongs D, Pahari D, Nath G, Ikizler TA (2015) BMC Nephrol 16(): 215 Citation · 26696239 (PubMed) PMC4687357 (PubMed Central)

3. Coenzyme Q10 dose-escalation study in hemodialysis patients: safety, tolerability, and effect on oxidative stress.

Yeung CK, Billings FT, Claessens AJ, Roshanravan B, Linke L, Sundell MB, Ahmad S, Shao B, Shen DD, Ikizler TWWA, Himmelfarb J (2015) BMC Nephrol 16(): 183. Citation · 26531095 (PubMed) PMC4630830 (PubMed Central)

Kaynaklar:

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ytbik/BiyografiKitapcigiPart-3.pdf

<http://www.vckd.org/vckd-members/t-alp-ikizler>